



29, 130/D



R. B. Bowman.















H I S T O R I A  
S A L I C V M

I C O N I B V S I L L V S T R A T A

A

GEORGIO FRANCISCO HOFFMANN

M E D. D.

---

V O L V M E N P R I M V M.

---

---

L I P S I A E

I M P E N S I S S I E G F R I E D L E B R E C H T C R V S I I  
C I D C C L X X V I I.





H I S T O R I A  
S A L I C V M

I C O N I B V S I L L V S T R A T A

A

GEORGIO FRANCISCO HOFFMANN

---

F A S C I C V L V S P R I M V S.

---

Nectarium maximi fecit natura.

LINN.

---

L I P S I A E

I M P E N S I S S I E G F R I E D L E B R E C H T C R V S I I

M D C C L X X V.





V I R O

P E R I L L V S T R I A C E X C E L L E N T I S S I M O

D N. D N.

D. CASIMIRO CHRISTOPHORO  
S C H M I D E L I O

S E R E N I S S. M A R G G R. B R A N D. O N O L S B. E T C V L M B. A C O N S. A V L. I N T.

E T A R C H I A T R I P R I M A R. C O L L. M E D. O N O L D I N. P R A E S I D I S

R E L.

A C A D. I M P. N A T V R. C V R. A D I V N C T I S O C. B O T A N.

F L O R E N T. E T S C I E N T. H A R L E M E N S.

S O D A L.

Q V I I P S E H O C O P V S C V L V M R A R I O R I B V S S A L I C I B V S

C O N D E C O R A V I T

I N D O C V M E N T V M O B S E R V A N T I A E

E T G R A T I T V D I N I S S V A E

D. D. D.

G E O R G I V S F R A N C I S C V S H O F F M A N N.

U. S. N.

OFFICE OF THE SECRETARY OF THE NAVY

WASHINGTON

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

DEPARTMENT OF THE NAVY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT OFFICE OF THE SECRETARY



CONSPECTVS SALICVM ET TABVLARVM,  
QVAE IN PRIMO VOLVMEINE CONTINENTVR.

I. SALIX <i>monandra</i>	—	—	—	p. 18. <i>Mas.</i> Tab. 1. fig. 1. <i>Fem.</i> — — — 2. 3 <i>amenta matura.</i> Tab. 5. fig. 1. <i>Folia.</i> Tab. 23. fig. 1.
II. SALIX <i>viminalis</i> .	—	—	—	p. 22. <i>Mas.</i> Tab. 2. fig. 1. <i>Fem.</i> — — — 2. <i>amenta matura.</i> Tab. 5. fig. 2. <i>Folia.</i> Tab. 21. fig. 2. a—c.
III. SALIX <i>Caprea</i> .	—	—	—	p. 25. <i>Mas.</i> Tab. 3. fig. 1. <i>Fem.</i> — — — 2. <i>amenta matura.</i> Tab. 5. fig. 4. <i>Folia.</i> Tab. 21. fig. 1. a—d.
IV. SALIX <i>aurita</i> .	—	—	—	p. 30. <i>Mas.</i> Tab. 4. fig. 1. <i>Fem.</i> — — — 2. <i>amenta matura.</i> Tab. 5. fig. 3. <i>Folia.</i> Tab. 22. fig. 1. a—d.
V. SALIX <i>acuminata</i> .	—	—	—	p. 39. <i>Mas.</i> Tab. 6. fig. 1. <i>Fem.</i> — — — 2. <i>Folia.</i> Tab. 22. fig. 2. e—g.
VI. SALIX <i>alba</i> .	—	—	—	p. 41. <i>Mas.</i> Tab. 7. fig. 1. <i>Fem.</i> — 8. — 2. <i>Folia.</i> Tab. 24. fig. 3.
VII. SALIX <i>triandra</i> .	—	—	—	p. 45. <i>Mas.</i> Tab. 9. fig. 1—2. <i>Fem.</i> — 10. — 3—4. <i>Folia.</i> Tab. 23. fig. 2. b—d.
VIII. SALIX <i>vitellina</i>	—	—	—	p. 57. <i>Mas.</i> Tab. 11. fig. 1. <i>Fem.</i> — 12. — 2—3. <i>Folia.</i> Tab. 24. fig. 1.
IX. SALIX <i>fissa</i>	—	—	—	p. 61. <i>Mas.</i> Tab. 13. fig. 1. <i>Fem.</i> — 14. — 3—4. <i>Folia.</i> Tab. 13. fig. 2.
X. SALIX <i>depressa</i> .	—	—	—	p. 63. <i>Mas.</i> Tab. 15. fig. 1. <i>Fem.</i> — 16. — 3—4. <i>Folia.</i> Tab. 15. fig. 2.
XI. SALIX <i>myrsinites</i> .	—	—	—	p. 71. <i>Mas.</i> Tab. 17. fig. 1—2. <i>Fem.</i> — 18. — 1—2. <i>Amenta matura</i> Tab. 19. <i>Folia.</i> Tab. 24. fig. 2.
XII. SALIX <i>herbacea</i> .	—	—	—	p. 74. <i>Mas.</i> Tab. 20. fig. 3. <i>Fem.</i> — — — 1—2. <i>matura capsula.</i> — 4.

---

## ADDENDA ET EMENDANDA.

- Pag. 1. Stigmata duo bi-quadrifida, lege, stigmata duo (quatuor indiuisa) bifida, et anthera quadri-octolocularis, lege, anthera bi-quadrilocularis, loculamentis bifidis, fuscatis.
- Pag. 18. *Salix monandra*, helix, adde  $\beta$  purpurascens,  $\delta$  capite squamoso. *Chlor. Lugd.* p. 29. adde Roedwiar. *Succis.* virgae tenacissimae, quibus tecta straminea ligantur ultra seculum duratura in Scania. Sepes e frutice praestantissimae fiunt. *Fl. Suec.* 834.
- Pag. 22. *Salix viminalis*, adde,  $\beta$  angustifolia. *Chlor. Lugd.* 29.
- Pag. 26. gouth, lege, great round-leaved.
- Pag. 28. var. 1. adde, *Fl. lapp.* 3. 61. Tab. 8. Fig. n.
- Pag. 29. lignum laeve, lege, lignum leve, molle ad arculas, thecas, manubria securum, ligno etiam cultri mensarii acuuntur et poliuntur. RAI. Frondes pro vitulis paruis Elfiverme!. Decoctum in cardialgia sputatoria Lappon. vsitatum. Cortex coriarius etc. *Fl. Suec.*
- Pag. 44. *body of plainting by Hamburg*, lege, *planting by Hanbury*.
- Pag. 45. fugit, lege, fugat, et cicata, lege, cicada.
- Pag. 46. thining, lege, fhining, et saule de feuilles, lege, a feuilles d'amandier.
- Pag. 57. *Salix vitellina*, adde, var.  $\beta$ . rubescens. *Chlor. Lugd.* p. 29.
- Pag. 64. *Sal. depressa*, adde, ex autoritate cel. EHRHART huc spectant, *salix incubacea* WEB. *spicil.* *salix fusca*. LINN. *amoen.* v. 3. p. 428. *salix procumbens* foliis ovato-lanceolatis, subtus sericeis. HALL. *Gott.* p. 8. *salix turfacea*. MÜNCHH. *Hausv.* v. 5. p. 305. *salix rosmarinifolia*. MURRAY *Prodr.* p. 78. *salix arenaria* SCHOLLER. flor. n. 791. etc.
- Pag. 66. potius *sal. herbacea*, lege potius *sal. myrtilloides*.
-



***S**i nulla alia mihi commemoranda esset causa, cur TIBI VIR  
PERILLVSTRIS hoc opusculum offerrem, quam ut TVO ipso  
nomine commendaretur et posthaec TVAE esset tutelae, nemo certe  
foret, cui non iusta et grauis videretur; sed illud grauius esse censebam,  
obseruantiam erga TE meam publice testatam ut faccerem, et ostende-  
rem, in eo me verissime laborare, ut ea, qua me dignatus es, beneuolen-  
tiae TVAE significatione non indignus videri possem. Suscipe igitur*

*qualecunque hoc grati saltem animi testimonium, ea non solum, qua  
me, sed iam Patrem meum amplexus es humanitate, meque in favore  
TVO quam diutissime acquiescere permitte. Scripsi Erlangae, Mens.*

*Febr.* CLIO CCLXXXV.



---

## P R A E F A T I O.

**Q**uemadmodum rei herbariae maximo semper fuit et augmento, et emolumento, clarissimorum virorum industria novas ac ignotas plantas cognitatas et descriptas habere; ita etiam ad perficiendam et subleuandam eam non parum contulit, si in re botanica exercitatissimi ac longe celeberrimi viri in singulares vegetabilium classes, familias aut genera, neque de nouitate, sed potius de accurata ac certa eorum cognitione solliciti, studium conferrent suum. Quorum negotium in iis praesertim generibus, quae plures subiectas comprehendunt species, saepe ita difficiles et incertas, ut etiam exercitatissimi botanici operam frustrari possint, maxime sentitur. Quae quum ita sint, aliquam apud rei herbariae cultores me initurum gratiam sperabam, si genus Salicum, cui tertium locum

cum

cum in aestimatione ruris CATO attribuit \*), prioremque quam oliuetis, quamque frumento, aut pratis \*\*), paene neglectum a botanicis, et multa adhuc cognitionis obscuritate inuolutum, de nouo monente id ipsum b. a LINNE \*\*\*), non solum secundum partes a plerisque in descriptione specierum omissas, gemmam, foliationem, nectarium etc. describerem, sed etiam iconibus omni cura ad naturae typum adumbratis illustrarem. Quod ut eo melius fieret, primum omnem curam in eo posui, ut marem suae verae respondentis feminae adsociarem, dein varietates a veris speciebus, quarum aliquas nouas constitui, aliquas amplius definitas atque expeditas reddidi, probe discernerem; id quod in hoc genere omnino necessarium, ubi tanta ramorum, amentorum et foliorum varietas et etiam formae, vel (ut cum botanicis loquar) habitus mutatio, ut nisi difficillime intermediae stirpes, quae per omnes gradus ad veras species magis minusue vel accedunt, vel recedunt, ab iis distingui possint. Siquidem in hoc labore etiam virorum de re herbaria optime meritorum observationibus usus sum, sed paucis, potius amplissimam eorum specierum cognitionem admiratus sum, quam definita satis et absoluta descriptione in cognoscendis iis adiutus. Iam summus botanicorum b. a LINNE de  
falicum

\*) *De re rustica*, Cap. 6.

\*\*) PLIN. *Hist. nat.* L. 16. S. 69. Ed. HARD. T. II. p. 50.

\*\*\*) *Syst. Pl.* 4. p. 234.



falicum familia sic conqueritur: quae si vlla in Botanicis obscura, haec sane maxime; descriptiones enim haud sufficientes sunt, figurae malae, differentiae exiguae, varietates plures, vt omnes haftenus editi in Re herbaria libri non satisfaciant nostro scopo \*).

Optimum itaque duxi, eas non solum verbis, sed etiam penicillo describere. Icones pleraeque ramulos florentes vtriusque sexus naturali ostendunt magnitudine, in quibusdam appositis foliis, vel amentis femineis maturefcentiae tempore depromptis, in aliis, ob spatii angustiam et deformitatem tabulae, quae exorta esset, omissis. Species, quas non ipse recentes colligere et adumbrare licuit, non ad eum perfectionis gradum, vt optassem, euehere potui, minutas praesertim fructificationis particulas, quas vbi recentes flores inquirendi occasio fuerit, sollicitè naturali et ad lentem vitream aucta magnitudine delineavi.

Nunc pauca de ordine ac modo, quo in describendo usus sum, dicenda supersunt. Generis characteres a b. LINNEO constituti et a natura confirmati, etsi aliter longe celeberrimi viri de iis sentire videantur, hinc inde emendati et figuris illustrati opusculo praefixi. In ordine autem instruendo si methodi linneanae, a foliorum integritate, vel eorum hirsutiae aut glabritiae, vel ab in-  
florescen-

\*) Fl. lapp. p. 280.

florescentiae modo defunto, ductum sequi voluissẽm, multis me statim implicassẽm difficultatibus, quum species varias a me adhuc desideratas, non suo loco inferere potuissẽm. Volui itaque potius nullum feligere, quam incompletum et mancum relinquere. Attamen ad finem perducto opusculo tabula peculiaris omnium descriptarum falicum folia, fere vt in Fl. Lapponica, depicta et methodo Linneana collocata sistet. Synonyma ea adduxi, quae, vt ex ampliori descriptione, vel alio modo coniecturare licebat, in eandem speciem magis quadrare viderentur. Vsum denique medicum vel oeconomicum, et alia notatu digniora breuissimis tantum verbis in obseruationibus annotaui. Quaenam vero de iis in antiquorum monumentis reperiuntur, quaeque praesertim species iis cognitae fuere, in fine opusculi, quantum fieri poterit, explicandi animus est.

---



## EXPLICATIO TABULARVM

## HVIVS FASCICVLI.

*De figuris omnibus id quidem notatu necessarium, hoc signo (o) earum per  
lentem factam amplificationem designari.*

---

## TABVLA I.

## SALIX MONANDRA.

Fig. I. *Mar.* Ramulus cum amentis partim explicatis, partim efflorescentibus depictus.

- a. *Valuula* gemmae amentaceae, cum amento masculo nondum explicato.
- b. *Valuula* gemmae foliaceae.
- c. *Valuula* gemmae amentaceae alia, quae amento nunc maiori et superius efflorescente, reclinator, ut interior eius concava pars conspici possit.
- d. *Foliatio* seu foliorum situs intra valuulam, quae hic transuerse ramulo adplicatur.
- e. *Tubercula*, quae basi valuularum locata et varia saepe figura adparent.
- f. *Pedunculus* amentorum cum foliolis, quae hic amenta cingunt.
- g. *Squamae* ab initio imbricatae.
- h. *Squamae* exemptae et partim lente vitrea auctae, a latere
- i. ab anteriori,
- k. a posteriori facie depictae.
- l. *filamentum* flaminis, basi pilosum.

m. *Anthera*

- m. *Anthera* tetradyma a latere,
- n. a superiori lente visa;
- o. saepe diuisa, vt quasi ex duabus conflata videatur, etiam aucta.
- p. *Nectarium* vel conicum, vel cylindricum apice crassius.

Fig. 2. *Femina*. Partes tantum sexus hic depictae, habitu, nisi excipias amentorum magnitudinem, similis est ramulo depictae varietatis.

- q. *Squama* cum germine.
- r. *Squama* absque germine.
- s. *Germen* cum
- t. *nectario*.
- u. *Stigmata* a latere et
- w. a superiori visa.

Fig. 3. Variet. *feminae*.

- x. *Gemmae* duae laterales, quae in femina priori defunt. Reliquae *literae* partes sexus vt in priori designant.

## TAB. II.

## SALIX VIMINALIS.

Fig. 1. *Mas.* Superiora amenta iam fere deflorata, flaminibus marcescentibus, inferiora sensim euoluta depicta.

- a. *Squama* cum duobus flaminibus et nectario naturali et aucta magnitudine.
- b. *Filamenta*, quae non raro longiora.
- c. *Antherae* didymae posterius planae.
- d. *Nectarium* gracile.

Fig. 2. *Femina.* In hac foliola superiora citius explicantur.

- e. *Germen*.
- f. *Stylus* longissimus.
- g. *Stigmata* duo reflexa.
- h. *Nectarium* lineare germini adplicatum.
- i. *Squama*. Omnia naturali magnitudine.



## TAB. III.

## SALIX CAPREA.

Fig. 1. *Mas.* Ramulus superior, fere luxurians, amenta etiam minora lateralìa protrudit; frequenter magis a se distant amenta, nec ramuli ita hirsuti.

a. *Squama* cum duobus staminibus et nectario naturali et lente vitrea aucta magnitudine.

b. Staminum filamenta.

c. Antherae didymae.

d. Nectarium,

e. superius foveola depressum.

Fig. 2. *Femina.* Amenta superiora in hoc ramulo plane explicata.

f. *Squama.*

g. *Germen.*

h. Germinis *pedicellum*.

i. *Stigmata* duo.

k. *Nectarium* basi pedicelli sessile, naturali et aucta magnitudine.

## TAB. IV.

## SALIX AVRITA.

Fig. 1. *Mas.* Ramulus ex superioribus vnus, qui frequentes plura amenta gerunt, et luxuriant saepe amentis duobus, tribus in eodem pedunculo.

- a. *Squama* cum staminibus et nectario ex omni delincatae parte.
- b. *Staminum* filamenta longitudine incerta.
- c. *Antherae* subrotundae.
- d. *Nectarium* basi squamae sessile.

Fig. 2. *Femina.* Ramulus amentis pluribus (10 — 20) non raro occupatus.

- e. *Squama* cum germine et nectario, a latere depicta.
- f. *Germen* extra squamam ab anteriori conspectum, cum
- g. *Nectario* basi. pedicelli sessili.

## TAB. V.

- Fig. 1. Ramuli superior pars *S. monandr. fem.* cum amentis femineis et capsulis maturis, naturali magnitudine.
- a. *Capsula* adhuc integra cum stigmate persistente.
  - b. *Capsula* apice aperta et leniter reflexa cum pappo.
  - c. *Pappus* semen basi cingens.
  - d. *Semen* lineare.
- Fig. 2. Ramuli superior pars *S. vimin. fem.* cum amentis et capsulis iam ad maturitatem perductis. Superiora folia adhuc reuoluta margine et anteriora conuoluta apparent.
- a. *Capsula* integra tetragona cum stigmate coronata.
  - b. *Capsula* dehiscens, *valuulis* reuolutis et pappo prominente.
  - c. *Pappus* cum *semine*.
- Fig. 3. *S. aurit. fem.* Amenta matura, cum foliis fere explicatis depicta.
- a. *Capsula* apicibus reuolutis demum reflexis.
  - b. *Capsula* apice dehiscens et reuoluta.
  - c. *Capsula* *valuulis* reflexis.
  - d. *Pappus* cum *semine*.
- Fig. 4. *S. Caprea* cum maturō amento et superioribus nondum planē euolutis ramuli foliis.
- a. *Capsula* integra, dein dehiscens
  - b. *valuulis* reuolutis.
  - c. *Capsula* dehiscens cum seminibus pappo cinctis, auolantibus.
-



## S A L I X.

LINN. *Gen. Pl. Ed. nov. n. 1201.*

HALL. *Hist. n. 1635.* TOURNEF. *p. 590. Tab. 364.*

**I**NVOLVCR. *Gemma* vel amentacea (*a*), vel foliacea (*b*); univalvis: valuula coriacea, decidua.

CAL. *Amentum* masculinum oblongum, undique imbricatum (*c*), constans *squamis* unifloris, oblongis, planis, patentibus (*d*).

COR. *Petala* nulla. *Nectarium* glandula baseos vel simplex (*e*), vel duplex (*f*), cylindracea, minima, truncata, mellifera apice, in centro floris.

STAM. *Filamenta* duo (1. 2. 3. 5.), recta, filiformia, calyce longiora (*g*); antherae didymae, tetradymae, quadri-octoloculares (*h*).

CAL. *Amentum* femineum ut in mare. *Squamae* ut in mare (*i*).

COR. nulla. PIST. *Germen* ovatum, attenuatum in stylum, saepe vix distinctum (*k*), bifidum, *squamis* calycinis paulo longiorem. Stigmata duo, bi-quadrifida, erecta (*l*).

PER. *Capsula* ovato-subulata, unilocularis, bivalvis (*m*): valuulis reuolutis (*n*).

SEM. numerosa oblonga (*o*), minima, cincta *Pappo* simplici, piloso, basi sesili (*p*).

### I. SALIX

(*a*) Tab. I. a.

(*b*) Tab. I. b.

(*c*) Tab. I. g.

(*d*) Tab. I. h.

(*e*) Tab. I. p.

(*f*) Tab. VII. c. d.

(*g*) Tab. I. II. IX. l. b. d.

(*h*) Tab. I. n. II. c.

(*i*) Tab. I. q. III. f.

(*k*) Tab. VIII. f.

(*l*) Tab. II. g. I. w.

(*m*) Tab. V. f. I. b.

(*n*) Tab. V. f. 2. b.

(*o*) Tab. V. f. I. c.

(*p*) Tab. V. f. I. d.

## S A L I X    M O N A N D R A.

Tab. I. fig. 1. 2.    Tab. V. fig. 1.

*Salix monandra*; foliis ferratis, glabris, lineari-lanceolatis, superioribus obliquis.

*Salix purpurea*; foliis ferratis glabris lanceolatis: inferioribus oppositis. LINN.

*Syst. Vegetab. Ed. 14. p. 879. n. 12. Syst. Plant. Ed. REICH. 4. p. 226. n. 11. Fl.*

*Suec. 2. n. 884. It. Scan. p. 252. MILL. Dict. n. 7. WEIG. Fl. Pom. 622. SCOP.*

*Carn. Ed. 1. p. 409. n. 4. Ed. 2. n. 1209. POLLICH Palat. n. 919. LEERS Herb.*

*n. 751. DOERR. Nass. p. 270. LIGHTF. Fl. Scot. p. 598. MATTVSCHK. Enum.*

*n. 930. RETZ. Prodr. Fl. Scand. n. 1087. HVDS. Fl. Angl. Ed. 2. p. 427. LEYS.*

*Hal. Ed. 2. n. 989.*

*Salix Helix*; foliis ferratis glabris lanceolato-linearibus: superioribus oppositis obliquis. LINN. *Syst. Veget. Ed. 14. p. 879. n. 13. Syst. Pl. 4. p. 226. n. 12. ROY.*

*Lugdb. 83. n. 4. DALIB. Paris. 299. MILL. Dict. n. 12. MÜLL. Fridr. n. 791.*

*NECK. Gallob. p. 397. DU ROI Obs. Botan. n. 5. EIVSD. Harbk. 2. p. 398.*

*GOUAN. Illustr. 76. LEERS Herb. n. 752. DOERR. Nass. p. 270. POLLICH*

*Palat. n. 920. LIGHTF. Fl. Scot. p. 597. MATTVSCHK. Sil. n. 712. EIVSD.*

*Enum. n. 931. HVDS. Fl. Angl. Ed. 2. p. 427.*

*Salix monostemon*, foliis glabris, lineari-lanceolatis, ferratis, superne coniugatis, iulis tomentosis. HALL. *Hist. n. 1640.*

*Salix humilior*, foliis angustis subcaeruleis, ex aduerso binis RAI. *Hist. 1421. Cant. 144.*

*Salix folio longo subluteo non auriculata, viminibus rubris. RAI. Syn. 3. 450.*

*Salix vulgaris rubens. BAUH. Pin. 473. n. 3.*

*Salix humilis capitulo squamoso. BAUH. Pin. 474. n. 11.*

*Salix rubra minime fragilis folio angusto. BAUH. Hist. 1. p. 215.*

*Salix Helice THEOPHR. DALECH. Hist. p. 279. BAUH. Hist. 1. 213. fig. 2.*

*Salix monandra. ARDVIN. Mem. 1. Spec. 67. Tab. 11. Fl. Lappon. Tab. 8. fig. 11.*

Gemeine rothe Weide. Rothe Bänd-Haarweide. Schußweide. Zäh Weide.

Heckweide. Rosenweide. Kleine niedrige Strauchweide. Braune Rosenweide.

Hagenweide. GLEDITSCH *Forstw. 2. p. 4. n. 41. p. 6. n. 47. HOECK Gesch.*



p. 14. 18. Die Bachweide, Sandweide. Rothe Weide. SVCKOW *Oecon. Botan.*  
p. 61. n. 6. p. 62. n. 7.

Purpurrothe Weide. Die Bachweide. LINN. *Pfl. Syst.* 4. p. 553. 554.

The purple Willow Tree. Smooth narrow-leav'd Willow. Rosewillow. The  
yellow Dwarf Willow. *Angl.*

Osier rouge des vignes. Amerine. Ambre. Petit saule à tête écailleuse. Marle  
Marceau. *Gall.*

Seu-Pül. *Dan.*

*Habitat* in Europa ad aggeres torrentum, ad fepes, locis humidis, in salicetis  
passim.

*Floret* Aprili. Capsulae maturefcunt Maio.

#### DESCRIPTION.

FRUTEX orgyalis, vel minoris altitudinis, in paruum arborem saepe exsur-  
gens; caulis glaber, cinereus, transverse rimosus; rami copiosi virgati, stricti, te-  
nacissimi, glabri; inferiores longissimi, alternantes, superiores non raro oppositi,  
diuergentes; rami nouelli purpurei vel corallini, maiores lutescentes vel subcinerei,  
omnes splendentes quasi vernice obducti; hinc inde punctis griseis vel etiam cinna-  
barinis adspersi.

GEMMA *amentacea* uniuersalis; valuula ex ouato oblonga, acuta, apice bifida,  
angulis seu lincis duabus eleuatis, longitudinalibus, apice non confluentibus in-  
structa; externe modice conuexa, glabra, ex brunno fusca vel nigricante, etiam  
purpurascens, interne concava, venis (6—7) parallelis picta. Ad basin huius  
valuulae tubercula duo, minima, ouata, per medium fulcata (Tab. I. f. 1. e).

GEMMA *foliacea* uniuersalis: valuula saepe dimidia parte priori minore, acu-  
minato-subulata, coloris fusci, margine dilutioris, ut plurimum eiusdem cum ra-  
mulo, apice subbifida, supra et infra amenta, saepe ex aduerso posita. In reliquis  
cum amentacea conuenit. *Foliatio* lineari-lanceolata, transuersim cauli applicata  
(T. I. f. 1. d), laxè imbricata, foliolis constans (6—7) linearibus, aequali *longitu-  
dine*; glabris, apice et ductu medii nerui hirsutiae tenui vestitis, pallide viridibus,  
apice vel purpureis vel nigris.

AMENTA *mascula* alterna vel opposita (in iunioribus ramulis praesertim),  
tomentosa, cylindracea, apice obtusa, primum recta, horizontalia, dein reflexa  
vel



vel flexuosa, breuissime pedunculata: pedunculo firmo duas circiter lineas longo, tomentoso; di-triphylo: foliolis basi amentorum (non pedunculi) sessilibus, lineari-lanceolatis, oppositis, patentibus vel reflexis, apice obtusis, vel breuissime acuminatis (f), pallide, viridibus, glabris, margine tenuissime pilosis, apice non raro fuscis. Amenta extrema parte vel vno latere primum, dein basi efflorescunt. *Squamae* ab initio imbricatae, dein patentes, postremo reflexae; subrotundae vel ouatae, concauae; illae apice obtusae pilis breuibus et raris obsitae (g), hae breuissime acuminatae (h) pilosae; ultra mediam partem nigrae, saepe rubicundae, basi albae. *Stamen* vnicum; filamentum rectum, horizontale, filiforme, satis firmum, squama sua duplo triplum longius, basi pubescens (l); anthera subrotunda, crassa, tetradyma, octolocularis (m), aurantii vel coccinei coloris, effuso polline nigra. *Pollen* lutissimum, anthera adhuc intra squamulam latente saepe explosum. *Nectarium* vnicum flavescent, conicum (p) etiam cylindricum (p), in iis praesertim amentis, ubi squamulae ouatae; obtusum, basi filamentum sessile.

**A M E N T A** *feminea* alterna vel opposita, cylindrica, minora masculis, uncialia, obtusa, primum erecta, dein reflexa, breuissime pedunculata: pedunculo firmo tomentoso; foliolis duobus, tribus basi sua instructa; lineari-lanceolatis, glabris, patentibus ac reflexis, apice sphacellatis. Plerumque foliola haecce maiora, quam in masculis amentis, colore pallide viridi; cum amentis decidua. *Squamae* ouatae vel subrotundae, concauae, villosae, germine appressae, seminigrae vel rubidae, basi ex albido viridescens (q). *Germen* ouatum, subglobosum (s), sericeum, pallide viride, sessile; stylus breuissimus vel nullus; stigmata duo, bi-quadrifida, obtusa, flauicantia vel rubella, demum nigra. *Nectarium* basi squamulae sessile, eaque triplo minus; subviride vel lutescent, (stigmatibus rubellis apice etiam rubellum) inferius latiusculum, compressum, apice truncatum (n), saepe bifidum. *Capsula* (Tab. V. fig. 1. a) ouata, sericea, subcinerea, latere utroque compressa, linea media eleuata, eiusque ductu apice dehiscens (b); unilocularis, bivalvis, valvulis reflexis. *Pappus* (c) brevis, tenuis, pilis flexuosis, implexis constans. *Semina* lanceolato-ouata, subfusca, basi pappo cincta (d).

**F O L I A** ouato-vel lineari-lanceolata, antea latiora et serrata, postea angustiora integerrima; superne glabra laete, inferne ex glauco viridia vel caerulea, saepe tomento fugaci obducta; tres uncias longa, unciam antea lata; nervus medius planus albescens, rufescens, per folii longitudinem ductus, nervuli laterales ad



ad angulum fere rectum ab eo excurrentes, luci obiecti transparentes rubri et pulcherrime anastomosantes; petioli glabri, breues, teretes, canaliculati caulique non raro appressi. Superiora folia saepiuscule opposita, patentia, erecta, vel obliqua; inferiora alterna. *Stipulae* nullae.

VARIET. *Tab. I. fig. 3. FEMINA.* Rami longissimi, cinerei, punctis nitidis, copiosis adpersi. Gemmae amentaceae oppositae; gemmae foliaceae etiam oppositae. Gemmarum valuulae fuscae, margine rubrae, apice bifidae, glabrae. *Amenta* frequenter opposita, cylindrica, sesquiuncialia, crassiora, tomentosa, tetraphylla: foliolis oblongis patentibus; pedunculus tres lineas longus, basi gemmis duabus, lateralibus, purpurascens, foliaceis cinctus. *Squamae* nigricantes tomentosae. *Germen* ouatum (s); stylus paulo longior; stigma simplex, truncatum, medio depressum (u), flavescent. *Nectarium* cylindricum, compressum.

Obs. Ramuli exsiccati angulosi et quasi striati fiunt. Occurrunt etiam ramuli colore cinereo viridi. Cortex interior praesertim iuniorum ramulorum apparet sulphureus vel pallide luteus; lignum est valde tenax et nitente albore; medulla albida. Tubercula basi gemmarum saepe quatuor vel plura occurrunt. Cum gemma amentacea sed rarius, gemmae foliiferae paruae (x), explicantur. Gemmae foliiferae plerumque coniugatim ramulum terminant. *Amenta* mascula saepiuscule foliolis quatuor cincta sunt. Folia exsiccata et intra chartam seruata facile nigrescunt.

In hac salice frequenter obseruantur Rosae sic dictae salicis \*), vel potius capitula squamosa in ramulorum summitate locata, Rosis quodammodo aemula, Insecti cuiusdam (cynips salicis?) ictu, squamulis tum in foliola excrecentibus \*\*), producta.

III. LINNAEVS hanc salicem in duas distinxit species, quas, monente HALERO et Cl. EHRHARTO \*\*\*), in vnam tantum coniunxi, quum nullum discrimen inter vtramque obseruare potuerim, et foliorum situs ita anceps et mutabilis sit, vt aegre exinde distingui possint, iamque Cl. EHRHARTVS in Horto vpsaliensi nullam aliam, ipso LINNAEO patre, deinde filio demonstratore, nisi monandam a me descriptam viderit \*\*\*\*). Anne ad hanc etiam pertinet: *Salix rubra*, foliis integerrimis, glabris, lineari-lanceolatis acutis HUDSONII \*\*\*\*\*)?

Haec

\*) EPH. NATVR. CVRIOS. Dec. I. Ann. 6. 7. Obs. 17. Ann. 3. Append. ad 362.

\*\*) IOH. HENR. HAGEN de Rosa Salicis. Regiomonti, 1769. 4.

\*\*\*) BALD. N. Mag. 4. B. 4. St. p. 319.

\*\*\*\*) l. c.

\*\*\*\*\*) Fl. Angl. Ed. 2. p. 428.



Haec Salix ob lentas ac flexibiles virgas ad varios oeconomicos vsus, ad sepes et ripas fabulosas muniendas, ad crates et corbes, ad circulos, quibus lignea vasa ac dolia colligantur, ad vincula, quibus in aqua maceratis vites vinciuntur, aliamque non modo agricolarum, sed et vrbanoꝝ supellectilem, spectabili subtilitate, vt inquit PLINIVS, texendam, perutilis.

2.

## S A L I X V I M I N A L I S.

Tab. II. fig. 1. 2. Tab. V. fig. 2.

Salix viminalis; foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. LINN. *Syst. Veget. Ed. 14. p. 880. n. 31. Syst. Plant. 4. p. 233. n. 29. Fl. Suec. 2. n. 901. DALIB. Paris. 297. MILL. Dict. n. 8. MÜLL. Fridr. n. 797. NECK. Gallob. p. 397. DU ROI Obs. Botan. n. 7. EIVSD. Harbk. 2. p. 403. DOERR Nass. p. 272. LEERS Herb. n. 757. POLLICH Palat. n. 924. LIGHTF. Fl. Scot. p. 608. MATTVSCHK. Sil. n. 714. EIVSD. Enum. n. 936. RETZ. Pr. Scand. n. 1103. HVDS. Fl. Angl. Ed. 2. p. 430.*

Salix foliis praelongis, obscure dentatis, subtus tomentosis et albicantibus. HALL. *Hist. n. 1641.*

Salix viminalis; foliis exstipulatis, lanceolato-linearibus, dentatis, rugosis, infra tomentosis; marginibus reflexis. SCOP. *Carn. Ed. 2. n. 1211. Ed. 1. p. 410.*

Salix foliis undulatis lineari-lanceolatis subtus tomentosis. ROY. *Lugdb. 84.*

Salix folio longissimo. RAI. *Angl. 3. p. 450.*

Salix folio longissimo angustissimo vtrinque albedo. BAUH. *Pin. 474.*

Salix foliis angustis et longissimis crispis, subtus albicantibus. BAUH. *Hist. 1. p. 212. DILL. App. p. 43.*

Elaeagnus. DALECH. *Hist. 278. MÜNTING. Ic. 12.*

Fischerweide. Grundweide. Grose Krebsweide. Arintsweide. Korbweide. Hanfweide. Lange Haarweide. Spitzweide. Flachsweide. Uferweide. Arintsbusch. Kneybusch. Elbweide. GLEDITSCH *Forstw. 2. p. 55. u. 46. HOECK Gesch. p. 24.*

Die Korbweide, Uferweide, Seilweide. SVCKOW *Oecon. Botan. p. 68. n. 9.*

Die Bandweide. LINN. *Pfl. Syst. 2. p. 413.*

The long-leav'd Willow. Osier Willow. *Angl.*

Saule à feuilles très longues, étroites & d'un vert argente. *Gall.*

Habitat in Europa ad pagos, ad fluuioꝝ ripas.

Florèt Maio. Capsulae maturescunt Iunio.

DESCRIB.



## D E S C R I P T I O.

**FRUTEX** saepe arborescens; primum ad terram deflexus, dein oblique erectus, orgyas aliquot altus, nudiusculus, glaber; cortice cinereo, glabro, hinc inde rimoso tectus; in iunioribus iunceus, citissime crescens; rami plerumque circa mediam caulis partem emissi, subalternantes recti, biennes longissimi, tenaces, e viridi lutescentes vel subcinerei glabri, superne non raro tomentosi, geniculis saepe fragiles, punctisque conspersi.

**GEMMA amentacea** uniuersalis: valuula ex ouato acuminata, apice emarginata vel leniter bifida saepe recurua, coriacea; extus modice conuexa, coloris liuidi, e luteo in cinereum vergentis, ramulis tomentosis etiam tomentosa; intus glabra, venis quatuor parallelis fuscis perfusa; lineolae marginales duae, apice non conniuentes. Tubercula basi gemmae 2 — 4. per medium sulcata.

**GEMMA foliacea** et supra et infra amenta, rarius intra amenta, locata, uniuersalis: valuula ouato-oblonga pallida vel ex cinereo brunna, coriacea apice subbifida, obtusa, extus modice conuexa, intus concava, venosa, priori dimidia parte *minore*, lineolae marginales duae, apice distantes. *Foliatio* imbricata, constans foliolis undecim, duodecim, oblongis, externe sericeis, supra amenta citius euolutis.

**AMENTA mascula** alterna, erecta vel inflexa, frequenter secunda, approximata, ex ouato oblonga, subuilloso, vncialia, sesquiuncialia, tres, quatuor lineas lata, breuissime pedunculata: pedunculo lineam longo, subuilloso, di-tetraphyllo; foliolis lanceolatis, sessilibus, superne viridibus, subtus sericeis, primum erectis, dein reflexis. Saepe eorum loco squamulae tantum lanceolatae, subfuscae, pedunculum cingunt. Amenta vel ex apice vel media parte efflorescunt. *Squamae* imbricatae, obouatae (a), planae, rotundatae et pilosae apice: pilis simplicibus rectis, squama longioribus; basi angustiores villosae; coloris ultra mediam partem cinereo-fusci, inferius pallide virescentis, venulis longitudinalibus parallelis pictae. *Stamina* duo; filamenta erecta, filiformia, valde debilia, basi coalita glabra, aversa antherae parte affixa (b c), squamula duplo longiora; antherae subrotundae, compressae, didymae, quadriloculares, luteae, apice saepe coccineae, citissime marcescentes. *Pollen* flauum. *Nectarium* unicum gracile, rectum, basi saepe geniculatum, apice capitatum, squamulae adnatum (d).

**AMENTA feminea** alterna, erecta, ouato-oblonga, vel cylindrica, subhirsuta, vncialia, sesquiuncialia, semunciam lata, pedunculata: pedunculo duas lineas longo, villoso, foliolis tribus aut quatuor externe sericis, interne viridiusculis,  
apice



apice non raro fuscis, lanceolatis, erectis vel reflexis cincto. Foliola in aliis exarida, squamosa, quatuor vel quinque, ut in mare, tantum adsunt. *Squamae* (i) imbricatae, planae, obouatae, obtusae, latiores fere quam masculae, margine ac ubique villosae: pilis squamula brevioribus; nigricantes vel subfuscae, basi coloris pallidi sensim diluti in albescentem. Venulae in squamulis luci obiectis ut in mare apparent. *Germen* ovato-lanceolatum sessile (c), subviride, sericeum; stylus (f) longissimus, longitudine germinis, filiformis, flavescent; stigma bifidum (g), tenue, flavescent, primum patens, dein reflexum. *Nectarium* unicum basi germinis sessile, compressum, dimidia germinis longitudine eique appressum (h) viridescens. *Capsula* ovato-subulata, tetragona (Tab. V. fig. 2. a), unilocularis, bivalvis: valvulis reuolutis (b). *Pappus* simplex pilosus: pilis longis, rectis; basi seminum sessilis (c). *Semina* oblonga.

**FOLIA** alterna, approximata, erecta, lineari-lanceolata, longissima; spithamam et ultra longa praesertim inferiora; acuminata, margine undulata, superiora vel iuniora reuoluta; petiolo insident tereti canaliculato, subtomentoso, semunciam longo; supra saturatius viridia, glabra, saepe pube tenuissima obducta, subtus sericea, argenteo splendore; nervo medio prominente, laterales nervuli albidii, paralleli, aliis brevioribus intercepti, horizontaliter fere diuergentes. *Stipulae* saepe in annuis ramulis adsunt, dimidiato-lanceolatae.

**VARIET. I.** *Salix* foliis ex lineari lanceolatis integris subtus incanis. **Gmel.** *Sib. I. p. 162. n. 16. Syst. Pl. 4. p. 234. var. β. (viminalis).* *Rami* ex viridi lutescentes, glabri, etiam supra amenta. *Folia* stricta, lineari-lanceolata, subtus sericea splendentia. *Gemma* utraque glabra, e luteo fusca. *Amenta* mascula et feminea erecta vel patentia, biuncialia; foliolis vel eorum loco squamis quinque, sex, lanceolatis, extus sericeis, intus fuscis cincta. *Stamina* squamis duplo longiora; antherae luteae citissime caducae. *Germen* ex ovato lanceolatum; stylus longitudine germinis rectus; stigma bi-quadrifidum, reuolutum.

**2. Mas.** *Rami* ex rubro fusci, glabri, punctis nigricantibus conspersi. *Gemma* amentacea univalvis: valuula magna ventricosa, apice subbifida, obtusa, coriacea, basi subtomentosa. *Gemma* foliacea priori similis, at longe minor. *Amenta* mascula alterna, numerosa, tomentosa, ovato-oblonga seu cylindrica, tetraphylla, foliolis minimis, lanceolatis, sericeis. *Squamae* ovatae, basi obscure purpureae, supra nigricantes; villosae: pilis squama duplo longioribus, rectis. *Stamina* duo; filamenta



filamenta longa; antherae flavae compressae. *Nectarium* dimidia squamae longitudine, flavescent, incuruum, apice truncatum.

3. *Fruticulus* tres, quatuor pedes altus; rami lutescentes vel fusci. *Gemmae* valuula glabra. *Amenta* mascula et *feminea* vix semunciam longa, hinc inde sparsa. *Folia* lineari-lanceolata, bi-tripollicaria, subtus sericea splendentia. Cacterum a viminali vix nisi magnitudine et forsan aetate diuersa.

OBS. Plures huius salicis praesertim feminae occurrunt varietates (an verae sint adhuc dubito), quae vel stigmata breuiora vel crassiora, et folia plus minusue habent incana. At sufficit foliis subtus argenteis, marem nectario gracili ac longo, feminam vero stylo longissimo, ab aliis facillime distingui posse.

Crescit haec salix locis praesertim limosis ac humidis, taleis sesquipedalibus, distantia sex circiter pedum in terram demissis. Trunco saepius caeso, citissime renascentibus et implicatis magis virgultis, densissima praebet sepimenta naturalia circa pagos et agros contra ventorum violentiam, et circa praediola, vel tuguria, ut fere omnes huius generis, tutamentum contra incendiorum saeuitiam; secundum amnes et vias publicas plantata virore ac iunceis virgis amoenissimas sepes viuas; victoribus sirpearum et nassarum vimina lenta ac flexilia ad viendum, perticas pro vario usu, foliaque tenera pecori depascenda, denique foco ac furno etiam non inutilia sarmenta ac ligna.

## 3.

## S A L I X C A P R E A.

Tab. III. fig. 1. 2. Tab. V. fig. 4.

*Salix caprea*; foliis ouatis rugosis subtus tomentosis vndatis superne denticulatis.

LINN. *Syst. Veget. Ed. 14.* p. 880. n. 30. *Syst. Pl. 4.* p. 232. n. 28. ROY. *Lugdb.* 83. *Fl. Succ. 2.* n. 900. GMEL. *Sib.* p. 157. DALIB. *Parif.* 298. MILL. *Dict.* n. 13. GVN. *Nor. Veg.* n. 252. MÜLL. *Fridr.* n. 796. NECK. *Gallo.* p. 395. DU ROI *Obs. Botan.* p. 54. n. 8. EIVSD. *Harbk.* 2. p. 404. GOUAN *Illustr.* p. 78. LEERS *Herb.* n. 756. DOERR. *Nass.* p. 271. POLlich *Palat.* n. 923. MATTVSCHK. *Sil.* n. 713. EIVSD. *Enum.* n. 935. LIGHTF. *Fl. Scot.* p. 607. RETZ. *Prodr.* n. 1102. HVDS. *Fl. Angl. Ed. 2.* p. 429. LEYSER *Halens.* Ed. 2. n. 991. (α. β.).

*Salix* foliis ouatis, rugosis, subtus reticulatis tomentosis, iulis ouatis, stipulis amplexicaulibus ferratis. HALL. *Hist.* n. 1653.



*Salix folio rugoso, obiter ferrato, subtus lanuginoso, iulo crassissimo.* HALL.

*Helv. p. 155. n. 17.*

*Salix caprea; foliis stipulatis, ovatis, subtus tomentosis; filamentis duobus distinctis.*

SCOP. *Carn. Ed. 2. n. 1205. Ed. 1. p. 407.*

*Salix foliis obscure crenatis, vtrinque villosis, ovato-oblongis.* Fl. Lapp. p. 291.

*n. 365.*

*Salix latifolia inferne hirsuta.* BAUH. *Hist. p. 215.* RAI. *Hist. 1422. n. 1.*

*Salix latifolia rotunda.* BAUH. *Pin. 474.* DILL. *App. 37.* RAI. *Angl. 3. p. 449.*

*Salix caprea latifolia.* TABERN. 1038. Fl. Lapp. Tab. VIII. fig. S.

Sohlweide. CRAMER *Forstw. Tab. 14. fig. 2.* Fl. Dan. Tab. 245.

Geißweide. Rauherwerft. Großerwerft. Sohl-Söhl-Seilweide. Hohlweide.

Streichpalme. Pfeifenholz. GLEDITSCH *Forstw. 2. p. 32. n. 48.* HOECK

*Gesch. p. 32.*

Die Werftweide, rundblättriche Sahlweide, Palmweide. SVCKOW *Oecon. Botan.*

*p. 63. n. 10.*

Die Palmweide. LINN. *Pfl. Syst. 2. p. 411.*

Round leav'd Sallow. The goute round leav'd Sallow. *Angl. Saugh. Scot.*

Saule ou Marceau, à feuilles rondes & larges, qui se terminent en pointe. *Gall.*

Viddie. *Dan.*

*Habitat* in Europa, in dumetis, ad sepes, ad radices montium et margines sylvarum, locis praesertim ficcis.

*Floret* Martio, Aprili. *Capulae* maturescunt Maio.

## DESCRIPTION.

FRUTEX non raro in magnam excrescens arborem; caulis glaber, cortice cinereo subtiliter rimoso obductus; rami copiosi tenaces, superiores longissimi, cortice e cinereo viridi vel flauescente etiam fusco obducti. Rami novelli pallescunt pubescunt.

GEMMA amentacea uniuersalis: valuula magna, ovata vel subrotunda, obtusa, apice emarginata vel subbifida, apicibus rotundatis, angulis seu lineis marginalibus binis sub apice coniunctis instructa; externe ventricosa vel hemisphaerica, glabra, brunna vel ex rubro fusca, saepe etiam pallida; coriacea, interne concaua venulis parallelis a basi versus apicem percursa. Ad basin huius valuulae tubercula nulla.

GEMMA



*GEMMA foliacea* uniuersalis: valuula a priori magnitudine parum diuersa, subrotunda, coloris fusci, apice bifida, lineae marginales ut in priori; plerumque infra, vel una alteraue gemma supra amenta posita. Tubercula ad basin eius etiam nulla. Caeterum priori non absimilis. *Foliatio* ouata, imbricata, foliolis (10-12) oblongis extus villosis sericeis, intus pallide viridibus composita.

*AMENTA mascula* alterna, erecta, villosa, ouata, vel ouato-oblonga, crassa, vncialia, biuncialia, vnciam saepe lata, breuiter pedunculata: pedunculo villoso, foliolis (8 — 12) vel etiam squamis, lanceolatis, externe sericeis villosis, interne fuscis, exaridis, apice frequenter reuolutis, duplici tripliciue serie circa pedunculum locatis. Amenta alternatim ex basi versus apicem, superiora quidem citius efflorescunt. *Squamae* (a) imbricatae, oblongae, basi angustiores canaliculatae, apice latiores, planae, deltoideae fere, acuminatae, margine ac ubique pilosae: pilis rectis squama breuioribus; supra nigricantes, basi viridescentes. *Stamina* duo (b); filamenta erecta, distincta, filiformia, polline exploso diuergentia, squama duplo longiora; antherae ouatae, didymae (c), erectae, quadriloculares, luteae, apice saepe rufescentes. *Nectarium* vnicum (d e) crassiusculum, rectum, subuiride, cylindricum, basi latefcens, apice subcapitatum, foueola depresso, squamae adnatum.

*AMENTA feminea* alterna, erecta, oblonga vel cylindracea, subhirsuta, vncialia, biuncialia, etiam longiora, semunciam lata, pedunculata: pedunculo longiori, foliolis (6 — 7) lanceolatis extus sericeis villosis, intus pallide viridibus vel fuscis saepe in foliola degenerantibus instructo. *Squamae* (f) imbricatae, planae, ouato-lanceolatae, obtusae, nigricantes ac pilosae apice: pilis rectis breuioribus; basi viridescentes, germinis pedicello adplicatae. *Germen* (g) ouato-lanceolatum vel pyriforme, pubescens, pedicellatum (h); stylus breuissimus; stigmata duo crassiuscula, compressa, flauicantia, saepe bifida. *Nectarium* (k) vnicum, basi pedicelli sessile, gracile cylindricum, compressum, truncatum, subuiride vel lutescens. *Capsula* (Tab. V. f. 4. a) basi subrotunda sensimque lanceolata, unilocularis biualuis: valuulis (b) reuolutis. *Pappus* (c) simplex pilosus: pilis longis, rectis, basi seminum sessilibus.

*FOLIA* subrotunda, ouata, obouata, ouato-oblonga, quatuor vel quinque vncias longa, tres circiter vncias lata, erecta, supra glabra vel subpubescentia, saturate viridia, subtus ex caeruleo incana, tomentosa, reticulo venoso picta; neruo medio robusto pubescente, prominente, albido vel colorato, lateralibus oppositis, promi-



prominentibus albidis, vel subalternis ramosis; apice acuminata, margine crenulato-vndulata, petiolata: petiolo non raro semunciam longo, tereti, tomentoso canaliculato, patente. *Stipulae* in superioribus tantum foliis, subrotundae, margine crenulatae, subtus incanae.

VARIET. I. *Salix* foliis oblongis subtus villosis, inferioribus crenatis, superioribus integris. *Fl. Lapp.* p. 293. n. 367? Tab. VIII. fig. u. *Salix* foliis oblongis integerrimis, acuminatis, superne villosulis subtus tomentosis. *Scop. Carn.* Ed. 2. n. 1205. var. 2. (d)? *Frutex* non raro arborescens; ramuli nouelli alba hirsutiae velati. *Folia* alterna ouata vel ouato-oblonga, vtrinque ex ouato acuminata, duas tresue uncias longa, unciam vel uncias duas lata, supra saturate viridia, glabra, vel subpubescentia, subtus incana, tomentosa, neruo medio vix prominente; plana; reticulo venoso vt in priori minus distinguendo, margine integerrima, brevius petiolata. *Stipulae* nullae vel in superioribus foliis minimae. Figura citata *Fl. Lapp.* folia exacte exprimit at descriptio potius in *S. acuminatam* quadrat.

2. FEMINA. *Salix* foliis ouato-lanceolatis integerrimis, subtus pubescentibus. *Salix* foliis elliptico-lanceolatis, subtus sericeis appendiculatis. *Gmel. Sib.* p. 163. n. 19? *Salix* foliis integerrimis, ouato-lanceolatis, subtus sericeis, iulis ouatis. *HALL. Hist.* 1651? *Hvds. Angl.* p. 429. (var.  $\gamma$ . *capr.*)? *Frutex* vel *fruticulus* ad ripas fluuiorum proueniens; rami cinerei vel cinereo-fusci, gemmae glabrae subrotundae. *Amenta* primum ouata; demum cylindracea, pedunculata, foliis 3—4 viridibus ouatis, subtus sericeis cincta. *Squamae* nigricantes villosae, ouato-lanceolatae. *Germen* sericeum ex ouato cylindricum; stylus longior; stigma bifidum, lineare, flauescens; nectarium truncatum. *Capsula* lanceolata, dehiscens reuoluta. *Pappus* longus, rectus. *Semina* lanceolata, pappo cincta. *Folia* ouato-lanceolata, mollissima, subtus pubescentia plana. Anne *salix* foliis integris glabris lanceolato-ouatis, *Fl. Lapp.* n. 358. ad hanc pertineat, vel propria species sit, adhuc ignoro.

### 3. FEMINA.

$\alpha$ . *Amentis* conicis tres circiter uncias longis, semunciam latis, breuiter pedunculatis, foliolis (4—5) intus fuscois extus sericeis. *Nectario* latiori, plano truncato viridi.

$\beta$ . *Amentis* tenuissime hirsutis, unciam longis, semunciam latis, breuiter pedunculatis, foliolis (6—7) fuscis sericeis. *Squamis* ouato-lanceolatis, nigerrimis. *Germine* pubescente; stigmate bi-quadrifido lutescente. *Nectario* cylindrico lutescente. *Ramis* glabris e luteo virescentibus, fragilibus.

OBS.



OBS. Haec salix, pro natali loco vel aetate, crescit ramis nunc brevioribus diuaticatis, nunc strictis, longioribus, cortice plus minusue fusco vel cinereo. Amenta varia magnitudine. Stylus bi-quadrifidus incerta longitudine. Instante pluuia mascula praesertim amenta odorem spirant suauissimum.

III. GLEDITSCHIVS in hac non solum monoicos, sed etiam hermaphroditos flores obseruari dixit \*).

In amentorum masculorum antheris deformitatem quasi viuiparam non raro animaduvertebam. Nam eae in stylum apice sua elongatae, basi crassiores, mediaeque parte diuisae, in utroque latere loculamenta duo, interne caua et margine tantum farinosa gerebant. Filamento caeterum tenuissimo sustentatae, primo intuitu quandam cum germine huius salicis similitudinem habent.

Ex ramis huius salicis corbes, cancellos, aluearia, pali et ridicae bene fieri possunt. Cortice ramulorum biennium vtuntur ad pelles varias praesertim manicarum in Dania \*\*) perficiendas. Nouaccolae ex cortice huius arboris praeparant coria sua pro calceis, quemadmodum rustici in Suecia inferiore ex cortice quercino eosdem conficere consueuerunt \*\*\*). Cortex fila lintea nigro tingit colore. Contra febres etiam commendat GÜNZIVS.

Lignum albidum tenax ac laeue; ex eo ligna fieri possunt, e quibus retia in aqua suspenduntur. Huius carbo citissime ignem concipit, quare eo ad puluerem tormentarium conficiendum vtuntur; etiam pictores ad delineanda opera huius carbones reliquis praeferrunt.

Amat siccum ac collinum terrenum. Prae reliquis Mas ob nectaria melle turgida et materiam copiosam, quam antherae pro cera conficienda apibus praebent, circa castra apium coli ac poni meretur. Folia tam huius, quam S. fragilis pecoribus et equis grata. Tarandos etiam folia huius deuorasse vidit GVNNE-RVS \*\*\*\*).

#### 4. SALIX

\*) GLEDITSCH *Forstw.* 2. p. 10.

\*\*) BECKMANN *Technologie*, Ed. 2. p. 213.

\*\*\*) *Fl. Lapp.* p. 292.

\*\*\*\*) *Fl. Norveg.* n. 252.



## S A L I X    A V R I T A.

Tab. IV. fig. 1. 2. Tab. V. fig. 3.

*Salix aurita*; foliis integerrimis vtrunque villosis obouatis appendiculatis. LINN.

*Syst. Vegetab. Ed. 14. p. 880. n. 22. Syst. Plant. 4. p. 230. n. 20. Fl. Suec. 2. n. 892.*

ROY. *Lugdb. 84. NECK. Gallob. p. 395. LEERS Herb. n. 754. POLLICH Palat.*

*n. 921. LIGHTF. Fl. Scot. p. 602. MATTYSCHK. Fl. Sil. Suppl. 1216. EIVSD.*

*Enum. n. 932. RETZ. Prodr. Fl. Scand. n. 1094. HUDS. Fl. Angl. p. 430. (var. 8. capr.)*

*Salix foliis rugosis, reticulatis, integerrimis, inferne tomentosis, iulis ouatis. HALL.*

*Hist. n. 1652.*

*Salix foliis stipulatis ouatis: subtus tomentosis, filamentis duobus basi coalitis.*

SCOP. *Carn. Ed. 1. p. 406. Ed. 2. p. 254. (var. 2. capr.)?*

*Salix folio rotundo minore. DILL. App. p. 38.*

*Salix caprea pumila. RAI. Angl. 3. p. 450. EIVSD. Hist. 1426?*

*Salix latifolia minor. BAUH. Pin. p. 474. RVPP. Ienens. 2. p. 333. GERAR. Emac. 390. fig. 3.*

Kleiner rauher und rundblättricher Werft. Salbeiweide. GLEDITSCH *Forstw. 2. p. 7. n. 51. HOECK Gesch. p. 21.*

Die kleine rundblättriche Werftweide, die Salbeiweide. SVCKOW *Oecon. Botan. p. 65. n. 13.*

Geöhrte Weide. LINN. *Pfl. Syst. 4. p. 560.*

The Dwarf round leav'd Sallow. Round leaved mountains Dwarf Sallow. Common Willow. *Angl.*

Petit faule ou marceau à feuilles rondes. *Gall.*

*Habitat in Europae sylvis, locis vdis, depressis.*

*Floret Maio. Capsulae maturescunt Iunio.*

## D E S C R I P T I O.

FRUTEX angustus, aliquot pedes altus, saepe arbor tenuis humanae altitudinis, depressus, iam a terra vndique ramos spargit; cortice cinereo, glabro integerrimo tectus; rami copiosi diffusi, tenaces, glabri; inferiores longissimi; superiores breuiores, diuergentes, diuaticati; nigricantes vel subfusci; epidermis subtilissime



fine rimosa, in extrema ramulorum parte subtomentosa. Ramuli nouelli foliosi, rubicundi, plerumque tomentosi.

GEMMA *amentacea* vniualuis: valuula subrotunda, vel ouata, ventricosa, apice emarginata; fusca vel spadicea; externe glabra vel basi subtomentosa; interne concava venulis inter se coniunctis perfusa; anguli seu lineolae laterales sub apice connexae. Tubercula basi duo opposita.

GEMMA *foliacea* et supra et infra amenta posita, vniualuis: valuula minima, subrotunda, conuexa, apice obtusa, primum emarginata, dein bifida, margine fusca vel nigricans; lineis duabus conniuentibus cincta; feminea intus saepe albicans; mascula colorata, venosa. *Foliatio* ouata, imbricata, foliolis constans (10—12) ouatis extus sericeis, intus saturate viridibus, rugosis.

AMENTA *mascula* alterna, erecta vel patentia continua, rarius gemma foliacea intercepta, ouata, obtusa, subuilloso, semunciam et ultra longa, tres quatuor lineas lata pedunculata: pedunculo breui tomentoso, foliola circa pedunculum plura (5—6) ouata vel subrotunda crassiuscula, interne saturate viridia, externe villosa, sericea, pallida fere sessilia, superiora foliola minima lanceolata. Amenta ex vno latere efflorescunt. *Squamae* (a) imbricatae, planae, ouato-lanceolatae superius colore fusco vel pallidiore, basi albescente vel ex albo flauescente, margine ac ubique villosae; pilis squama brevioribus, raris. *Stamina* duo; filamenta (b) erecta filiformia, squama duplo triploue longiora, basi connata, subpilosa, superius diuergentia; antherae (c) subrotundae paruae, erectae didymae, quadriloculares, flavae, ante explicationem fulvae. *Pollen* luteum. *Nectarium* (d) minimum breue ouato-cylindricum basi latefcens, apice obtusum, subcapitatum, e luteo viride.

AMENTA *feminea* alterna, erecta vel patentia, ouata, ouato-oblonga, cylindrica, obtusa, semunciam, vnciam longa, semunciam lata, subuilloso, albida nitentia, dein ex cinereo pallide viridia, pedunculata: pedunculo longiori, tomentoso; foliolis alternis ovalibus, vel ouatis; superioribus lanceolatis minimis; supra saturate viridibus, subtus villosis sericeis, cum amentis explicatis, et deciduis. *Squamae* (e) imbricatae planae, lineari-lanceolatae, minores, apice fuscae vel pallidae, basi albescents; villosae: pilis albissimis, nitidis, longitudinem squamae aequantibus. *Germen* (f) cylindricum, lanceolatum, albidum sericeum, vel pallide viride, pedicellatum pedicello tereti, pubescente, squamula fere longiori; stylus nullus vel breuissimus; stigmata duo sessilia, crassiuscula, cylindrica, bifida, conniuentia, pallide lutea. *Nectarium* vnicum, basi pedicelli sessile, breue, cylindricum, apice truncatum.



catum, flavescent (g). *Capsula* (Tab. V. fig. 3. a) ovato-oblonga, pubescens, apice dehiscens, bivalvis: valvulis apice reuolutis, demum reflexis. Semina linearia. *Pappus* (b) simplex, albescens, longitudine capsulae, basi seminum sessilis.

**FOLIA** erecta vel patentia, adproximata, subrotunda, vel obouata, apice obtusa vel brevissime acuminata, inflexa, margine integerrima, saepe undulato-crenata; supra saturate viridia, subpubescentia, secundum venas rugosa, nervo medio et lateralibus sulcatis; subtus pallidiora, tomentosa eleganter reticulata, nervis prominentibus albidis, lateralibus pinnatis, alternis, ad marginem folii usque ductis; petiolata: petiolo breui, tereti, albido, tomentoso. *Stipulae* ad petiolorum basin duae reniformes, margine repando-dentatae, basi contractae sessiles; superne colore foliorum, rugosae, inferne tomentosae, nervis albidis prominentibus, ex centro in peripheriam ductis. Folia iuniora tactu molliora et planiora, vncialia; adultiora biuncialia et ultra, ovata vel ovato-oblonga, rigida, rugosa; margine crenulata, dentata. *Stipulae* maiores.

**VARIET.** *Salix* foliis integris vtrinque villosis verticaliter ovatis appendiculatis: *Fl. Lapp.* 369. Tab. 8. Fig. y. *Rami* nigricantes vel rubro-fusci. *Amenta* mascula maiora cylindrica; pedunculo longiori; foliolis numerosis, oblongis vel lanceolatis, minimis, colore viridi vel fusco, externe villosis. *Squamae* apice obtusiusculae nigricantes, vel fuscae. Filamenta staminum longiora. *Amenta* feminea cylindrica vnciam, fescunciam longa; pedunculo longiori, foliolis numerosis cincto. *Squamae* ut in Mare. *Folia* ovato-oblonga, anterieus latiora, brevissime acuminata, basin versus angustissima, vncialia, biuncialia, anterieus semunciam, vnciam lata, verticaliter posita, seu adfixa parte acuminata, petiolis longioribus. In aliis a priori non diversa.

**Obs.** Haec *salix* florendi tempore a similibus, *caprea*, acuminata, quibuscum promiscue crescit et saepe confunditur, non male distingui potest. Autumno saepe de nouo efflorescit et amenta aliquot explicat. Tubercula opposita in angulis gemmarum.



H I S T O R I A  
S A L I C V M

I C O N I B V S I L L V S T R A T A

A

G E O R G I O F R A N C I S C O H O F F M A N N

---

F A S C I C V L V S S E C V N D V S.

---

Nectarium maximi fecit natura.

L I N N.

---

L I P S I A E

I M P E N S I S S I E G F R I E D L E B R E C H T C R V S I I

M D C C L X X V.





EXPLICATIO TABVLARVM  
SECUNDI FASCICVLLI

---

TAB. VI.

SALIX ACUMINATA.

Fig. 1. *Mas.* Ramulus cum amentis, superioribus praesertim, plane explicatis.

- a. *Squama* cum staminibus et nectario.
- b. *Staminum* filamenta.
- c. *Nectarium* basi squamae sessile.

Fig. 2. *Femina.*

- d. *Squama* cum germine et nectario.
- e. *Germen.*
- f. *Germinis pedicellum.*
- g. *Stigmata.*
- h. *Nectarium.*
- i. *Capsula* integra, dehiscens
- k. *valvulis* reflexis.
- l. *Pappus* basi feminum sessilis.

## TAB. VII. VIII.

## S A L I X A L B A.

Fig. 1. *Mas.*

- a. *Squama* cum staminibus et nectariis.
- b. *Staminum* filamenta.
- c. *Nectarium* anterius.
- d. *Nectarium* posterius.

Fig. 2. *Femina.*

- e. *Squama*.
- f. *Germen* cum stigmatibus quatuor ab anteriori visum.
- g. *Squama* absque germine, cuius basi adsidet
- h. *nectarium*.
- i. *Capsula*, dehiscens
- k. *valvulis* reclinatis demum reflexis.
- l. *Pappus* cum semine.
- m. *Amentum* ad maturitatem plane perductum.



## TAB. IX. X.

## SALIX TRIANDRA.

Fig. 1. *Mas.* Amenta superiora conica sensum ab inferiori parte versus apicem explicata, inferiora vero adhuc clausa, foliolis pedunculo plerumque tribus instructo. a.

Fig. 2. *Mas.* Ramulus cum amentis paene defloratis. Foliola plura et maiora pedunculum cingunt. b.

c. *Squama* cum tribus staminibus et nectariis.

d. *Staminum* filamenta.

e. *Nectarium* anterius.

f. *Nectarium* posterius in media squamae parte locatum.

Fig. 3. *Femina.* Ramulus cum amentis plane explicatis.

g. *Squama.*

h. *Germen.*

i. *Stigmata.*

k. *Nectarium.*

l. *Capsula* integra, dehiscens

m. *valvulis* reflexis.

n. *Pappus.*

o. *Semen.*

p. *Amenium* maturum.

Fig. 4. Siftit ramulum cum foliis.

q. Folia, varia directione et situ depicta.

r. Stipulae.





## S A L I X   A C U M I N A T A .

Tab. VI. fig. 1. 2.

Salix acuminata; foliis ovato-oblongis, subtus tomentosis; superioribus integris, inferioribus crenatis.

Salix acuminata; foliis oblongo-ovatis, acuminatis rugosis, subtus tomentosis.

MILL. *Dict.* 14. DU ROI *Obs. Botan.* p. 55. n. 9?

Salix foliis ovato-lanceolatis: supra pubescentibus subtus tomentosis. LEYS, *Hal.*

*Ed.* 2. n. 991. γ?

Salix foliis oblongis utrinque tomentosis, obtusis, modice acuminatis obiterque ferratis. SCOP. *Carn. Ed.* 2. n. 1205. (var. 2. d.)?

Salix caule erecto foliis ellipticis: apicibus rectis. SCOP. *Carn. Ed.* 1. p. 407. 3.

(b. c.)?

Salix foliis oblongis subtus villosis, inferioribus crenatis, superioribus integris. FL.

*Lapp.* n. 367?

Salix caprea acuto longoque folio. RAI. *Syn.* 450? HUDS. *Angl.* (var. β.

*Capr.*)?

Salix folio ex rotunditate acuminato. BAUH. *Pin.* 474. RVPP. *Ien.* 2. p. 333.

*Habitat* in dumetis, locis humidis, promiscue cum *S. aurita*.

*Floret* Martio, Aprili. Capsulae maturescunt Maio.

DESCRI-

## D E S C R I P T I O.

**FRUTEX** orgyalis; saepe arbor tenuis; caulis glaber, cinereus, diffusus; rami erecti copiosi diffusi; superiores breuiores, cinerei, lanuginosi, maculati, novelli canescentes alba hirsutie; inferiores stricti ex cinereo fusci, tomentosi.

**GEMMA amentacea** uniuersalis: valuula subrotunda obtusa, apice integra, emarginata; angulis lateralibus duobus planis sub apice conniuentibus instructa; externe conuexa, ventricosa, tomentosa, colore cinereo vel dilute fusco; interne concava glabra, fusca. Ad basin valuularum tubercula nulla.

**GEMMA foliacea** uniuersalis: valuula priori minor, ouata vel subrotunda apice obtusa, leniter emarginata rarius incisa, lineolae marginales duae, planae, apice conniuentes; externe conuexa tomentosa, cinerea vel pallide fusca; interne concava glabra, pallida, venulis aliquot tenuissimis percursa; supra infraque amenta posita; plerumque duae ramulum terminant. *Foliatio* ouato-oblonga, imbricata; foliolis constans (10—12) ouato-oblongis externe sericeis, interne pallide viridibus.

**AMENTA mascula** alterna, villosa, ouata vel ouato-oblonga unciam et aliquot lineas longa, semunciam lata, apice obtusa; primum erecta dein patentia, pedunculata: pedunculo breui duas circiter lineas longo, tomentoso; foliolis seu potius squamis (4—6) lanceolatis erectis, externe sericeis, interne fuscis, cincto. Amenta et basi et apice primum efflorescunt. *Squamae* (a) imbricatae, oblongae apice latiores, obtusae vel breuissime acuminatae, e fusco nigricantes, pilosae; pilis squama breuioribus; basi albae. *Stamina* (b) duo; filamenta primum erecta breuiora, dein longiora, anthesi peracta diffusa; filiformia, squama duplo longiora, basi subvillosa, nectario adnata, auersa antherae parte affixa; antherae ouatae, vel subrotundae, erectae, didymae, quadriloculares, colore luteo, ante expansionem fuluae. *Pollen* flauum. *Nectarium* (c) simplex, erectum, basi ventricosum sensimque quasi in collum attenuatum apice truncatum, virescens; basi squamae sessile.

**AMENTA feminea** alterna, erecta vel patentia, cylindrica uncialia et ultra, semunciam lata, incana, tomentosa, vel subvillosa, pedunculata: pedunculo longiori, quam in amentis masculis, tomentoso, foliolis (5—6) ouato-lanceolatis, externe sericeis, interne plerumque pallide fuscis, erectis, cincto. *Squamae* (d) imbr-



imbricatae ovato-lanceolatae, vel oblongae, apice obtusae vel brevissime acuminatae, fuscae, villosae, sensim versus basin angustiores, albidae. *Germen* (e) ovato-subulatum incanum vel ex albido viride villosum, pedicellatum: pedicello (f) tereti villoso squamae fere longitudine; stylus brevis; stigmata (g) duo erecta cylindrica, latiuscula saepe bifida, vel sulcata, colore lutescente. *Nectarium* (h) conicum, apice obtusum virescens, basi pedicelli sessile. *Capsula* (i) ovato-subulata unilocularis, bivalvis: valvulis reflexis (k). *Pappus* (l) longus rectus, semina lanceolata basi cingens.

FOLIA alterna erecta vel patentia in superioribus ramulis adproximata, obverse ovato-oblonga, vel ovato-lanceolata, apice retusa, acuta, saepe inflexa, margine integra vel subserrata, biuncialia anterieus vnciam lata; in ramulis inferioribus ovata, ovato-lanceolata, elliptica, acuta vel acuminata, margine crenulata; supra saturate viridia, levissime vel vix pubescentia plana, levissime rugosa; subtus tomentosa, pallida, vel glauca, reticulata; nervo medio prominente albido pubescente, lateralibus nervis oppositis vel alternis, ad marginem folii ductis; duas tresve vncias longa, petiolata: petiolo tereti, albido, tomentoso tres circiter lineas longo. *Stipulae* reniformes, sessiles margine repando-dentatae, colore et structura foliorum; in superioribus foliis plerumque nullae.

OBS. MILLERVS varietatem habet foliis variegatis. In hac salice synonyma difficillime extricanda, quae inter *S. capream* et *auritam* quasi intermedia, ab utraque tamen diuersa.

## 6.

## S A L I X A L B A.

Tab. VII. VIII. fig. 1. 2.

*Salix alba*; foliis lanceolatis acuminatis ferratis vtrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. LINN. *Syst. Veget. Ed. 14. p. 880. n. 33. Syst. Pl. 4. p. 234. n. 31. Hort. Cliff. 473. Fl. Suec. 2. n. 903. Mat. Med. Ed. 4. n. 587. DALIB. Paris. 297. ROY. Lugdb. 83. MILL. Dict. n. 1. GMEL. Sib. 1. p. 158. MÜLL. Fridr. n. 799. NECK. Gallob. p. 396. SCOP. Carn. Ed. 2. n. 1212. Ed. 1. p. 408. n. 2. GOUAN Illustr. p. 78. DUROI Obs. Botan. p. 54. n. 6. EIVSD. Harbk. 2. p. 400. LEERS Herb. n. 759. DOERR. Nassov. p. 272. POLLICH Palat. n. 925.*

L

MATTUSCHK.



- MATTVSCHK. *Sil.* n. 715. EIVSD. *Enum.* n. 937. LIGHTF. *Fl. Scot.* p. 609.  
 RETZ. *Prodr.* n. 1105. HVDS. *Fl. Angl.* Ed. 2. p. 430. LEYSER *Halenf.* Ed. 2.  
 n. 995. THVNB. *Japon.* p. 25.  
 Salix arborea, foliis ellipticis, lanceolatis, subtus sericeis, dentibus crassescens.  
 HALL. *Hist.* n. 1635.  
 Salix alba. LINN. *It. Scan.* p. 200.  
 Salix arborea angustifolia alba vulgaris. RAI. *Hist.* n. 1419.  
 Salix maxima fragilis alba hirsuta. I. BAUH. *Hist.* 1. p. 212.  
 Salix vulgaris alba arborescens. C. BAUH. *Pin.* 473. DILL. *App.* p. 42. RVPP.  
*Ien. Ed.* 2. p. 331.  
 Salix. LOB. *Ic.* 2. p. 136.  
 BLACKWELL *Tab.* 327.  
 Le Saule. REGN. *Bot.*  
 Baumweide. Weisse Weide. Felber. Weisser Felber, Felbinger, Falbinger. Wil-  
 genbaum. Wilge. Wicheln. Zäh Weide. Kopfweide. Großer Weidenbaum.  
 Mürbe Weide. Silberweide. Weisse Bruchweide. GLEDITSCH *Forstw.* 2. p. 3.  
 n. 39. HOECK *Gesch.* p. 29.  
 Die gemeine weisse Weide, Silberweide. SVCKOW *Oec. Botan.* p. 62. n. 8.  
 Die weisse Weide. LINN. *Pfl. Syst.* 2. p. 416.  
 Witte Wilg, Wilgenboom. Belg.  
 The ordinary great, the most common white Willow Tree. Angl.  
 Hwit Pihl. Suec.  
 Saule blanc ordinaire. Gall.  
 Verba. Vuerba. Folia Verbauza. Carniol.  
*Habitat* in Europae sylvis, ad vias, circa pagos et vrbes.  
*Floret* Maio. Capsulae maturescunt Iunio.  
 PHARM. Salicis cortex; Folia; Amentum. MURRAY *App. Med.* Vol. 1. p. 44.

#### DESCRIPTION.

ARBOR sat procera; caudice adscendente erecto tereti, arboreo, ramosis-  
 simo; cortice cinereo rimoso tecto; rami copiosi erecti vel patentes; cortice cine-  
 reo



reo vel e fusco virescenti, superiores saepe fusco-purpurascente obducti. In masculula arbore rami diffusi breuiore, superius leuissime pubescentes, geniculis saepe fragiles; in feminea strictissimi, truncis praesertim putatis, umbellam quasi formantes, tenaces.

*GEMMA amentacea* uniuersalis: valuula conica vel ouato-acuta, apice obtusa integra, lineis marginalibus binis apice conniuentibus cincta; externe basi sua subconuexa, leuissime pubescente etiam glabra, colore pallide rubro-brunneo; interne concaua, glabra venulis saepe obscurioribus picta.

*GEMMA foliacea* uniuersalis: valuula priori plerumque minore, ouata, vel ouato-acuta, colore ex cinereo pallide rubro-fusco, apice integra vel subbifida, margine lineis duabus apice conniuentibus instructa; externe subconuexa glabra vel leuissime pubescens; supra et infra amenta posita. *Foliatio* conuoluto-imbricata, foliolis (6—7) constans lanceolatis, externe sericeis.

*AMENTA mascula* (3—4) alterna, sparsa, tenuissime hirsuta, cylindrica, teretiuscula, apice obtusa; primum erecta, dein horizontalia, flexuosa; fescuncialia, biuncialia, lineas quatuor circiter lata, pedunculata: pedunculo tereti, tomentoso, semunciam longo, tri-tetraphyllo: foliolis ouato-lanceolatis, breuiter petiolatis, prona ac supina parte laete viridibus, margine et inferiori saepe pagina villosis; infimum foliolum integerrimum, ouatum, altero minori magnitudine, superius plerumque maximum margine saepe serrulatum, ultimum prope amenti basin lanceolatum, flauescens vel e viridi lutescens, squamula duplo modo longius. Foliola plerumque oblique patent. Amenta ex basi versus apicem efflorescunt. *Squamae* (a) ab initio imbricatae, dein erectae, postremo reflexae, ouato-lanceolatae antea latiores, concauae acutae, pilis simplicibus breuissimis hinc inde adspersae, colore ex viridi lutescente; basi angustiores villosae paululum fuscae. *Stamina* duo; filamenta (b) erecta vel horizontalia, filiformia, luteo-alba, basi connata, villosa, squama vix duplo longiora; antherae subrotundae, didymae, quadriloculares, luteae saepe apice purpureae, erectae, posterius complanatae. *Pollen* luteum. *Nectarium* (c) antea minimum ex viridi lutescens, ouatum apice obtusum; posterius (d) lineare, gracile, anteriori duplo longius, filamentis postice adnatum.

*AMENTA feminea* alterna, erecta, horizontalia vel reclinata, cylindracea, tenuia, biuncialia, tres quatuor lineas lata pedunculata: pedunculo tomentoso,  
vnciam



unciam fere longo, tereti, foliolis (4 — 5) alternis ovato-lanceolatis instructo, supra lacte viridibus, subtus pallidis tenuissime pilosis, margine villosis, saepius ferratis, apice acuminatis, pedunculatis, oblique patentibus vel reflexis, persistentibus; superiora foliola longitudine fere amenti inferiora minora magis obtusa; foliolum minimum lanceolatum ad basin amenti ut in mare. *Squamae* (e) oblongae apice acutiusculae, pilis brevissimis vix visibilibus adspersae, versus basin alba hirsutie tectae, colore ex viridi albescente. *Germen* (f) ovato-oblongum, sessile, basi ventricosum, abhinc sensim angustatum, virens, glabrum, squama paulo longius; stylus brevis apice bifidus; stigmata quatuor obtusa, pallide viridi-lutescentia. *Nectarium* (g h) unicum, cylindricum, compressum, apice truncatum lutescens, saepe emarginatum vel bifidum, basi virens, ad basin squamulae sessile. *Capsula* (i) ovato-oblonga, basi ventricosa brevissime pedunculata; maturitate flauicans, apice dehiscens, unilocularis, bivalvis: valuulis primum reclinatis, demum reflexis (k). *Pappus* splendens rectus (l).

FOLIA alterna erecta, lanceolata, acuminata, margine argute ferrata: ferraturis glandulosis fuscis; superne nitida, pubescentia, subtus albida sericea, in extremitate praesertim ramulorum supremorum; inferiora supra glabra nonnunquam subtus glauca, nervus medius albicans, laterales paralleli erecti; semunciam lata fere unciam aut duas uncias cum dimidia longa, petiolata: petiolo breui duas circiter lineas longo, compresso, canaliculato, tereti levissime pubescente. Iuniora folia convoluta; mascula angustiora magis sericea.

Obs. Haec salix locis praesertim ficeis insignem altitudinem (triginta pedum ut HALLERVS refert; et ADANSONIVS arboris huius salicis, diametro novem pedum mentionem fecit,) attingit. Ideoque in ambulacris et ad vias publicas prae reliquis plantari meretur, ubi foliorum argenteo splendore, quo iam e longinquo distinguitur, et ramorum densitate et visum delectat, et corpus a solis ardore defendit; nec crucae folia tam facile arrodunt. Librum sub cortice viride (in vitellina lutescit); lignum album leue, fibrosum, tenax, ferrae et dolabrae resistens. Placeat hominibus delicatioribus in Camino, parum enim fumat et aequabili calore ab igne consumitur \*). Rami recti et flexiles ad perticas, ad varia vincienda inferviunt.

Cortex

\*) *Body of plaining by Hamburg, p. 34.*



Cortex adstringit praesertim adultior, sed balsamica vi destituitur. Eius decoctum putredini resistit; iuniorum praesertim ramulorum corticem contra febres intermittentes \*) et lumbricos (quos praesertim *S. pentandra* fugit, \*\*) commendant. In cupreo vase coctus cortex lanca et sericea sanguineo, addito pauxillo aluminis cinnamomeo tingit colore. Haec salix truncata melleum stillat humorem. In calidioribus regionibus exsudat Mannam \*\*\*).

Sal. vitellinam LINN. huius varietatem esse putat HALLERVS, sed satis inter se differunt. Spuma alba (a cicata *spumaria*) in huius foliis frequens.

7.

## S A L I X T R I A N D R A.

Tab. IX. X. fig. 1. 2. 3. 4.

Salix foliis serratis glabris, floribus triandris. LINN. *Syst. Veget. Ed. 14. p. 879. n. 2. Syst. Pl. 4. p. 223. n. 2. MILL. Dict. n. 2. GORT. Ingr. 156. NECK. Gallob. p. 394. SCOP. Carn. Ed. 1. p. 409. n. 3. Ed. 2. n. 1214. DU ROI Obs. p. 51. n. 1. EIVSD. Harbk. 2. p. 384. GOUAN. Illustr. p. 76. LEERS Herb. n. 745. DOERR Nass. p. 269. POLLICH Palat. n. 916. MATTVSCHKE. Sil. n. 707. EIVSD. Enum. n. 924. RETZ. Prodr. n. 1080. HVDS. Fl. Angl. Ed. 2. p. 425. LEYS. Halens. Ed. 2. n. 986?*

Salix foliis glabris, elliptico-lanceolatis, serratis, stipulis dentatis, iulis gracilibus triandris. HALL. *Hist. n. 1637.*

Salix foliis elliptico-lanceolatis, vtrunque glabris serratis appendiculatis. GMEL. *Sib. 1. p. 155.*

Salix folio auriculato splendente, flexilis. RAI. *Hist. 1420. syn. 448.*

Salix folio amygdalino vtrunque virente aurito. C. BAUH. *Pin. p. 473.?*

GMEL. *Sib. 1. p. 155. Tab. 34. fig. 3.*

Mandelweide. Pfirsichweide. Schlickweide. Schälweide. Buschweide. Hägerweide.

Gemeine Korbweide. Pfahlweide. GLEDITSCH *Forstw. 2. p. 5. n. 44.*

Die

\*) CLOSSIVS *nov. variol. med. meth. p. 128. GVNZ Diff. 2. p. 25.*

\*\*) HARTMANN *Diff. de Salice laurea.*

\*\*\*) DU HAMEL *Physique des arbres, P. I. p. 152.*



Die Buschweide, Korbweide, Erdweide. *Svckow Oecon. Botan. p. 59. n. 1.*

Die dreyfädige Weide. *Linn. Pfl. Syst. 2. p. 400.*

Smooth Willow, Almond leaved Willow. The round ear'd thining Willow. *Angl.*

Saule de feuilles d'Amandier. *Gall.*

*Habitat* in Heluetia, Sibiria, Germania et ad ripas fluuiorum praesertim sabulosas.

*Floret* Aprili, Maio. Capsulae maturescunt Iunio.

### DESCRIPTION.

*FRUTEX* orgyalis vel ultra, rarius arborescens, cortice glabro, ex viridi flauicante vel cinereo obductus vbique fere ramos emittit; rami erecti, alterni tenaces, vel geniculis praesertim fragiles, superiores breuiiores; cortice ex cinereo vel fusco viridescente etiam flauesciente, maculis variegatis saepe sanguineis punctis adsperso, tecti.

*GEMMA amentacea* vniualuis: valuula coriacea nigricante vel fusca, ouata vel oblonga, acuminata, apice integra vel subbifida, lineis marginalibus duabus prominulis apice coniunctis cincta; extus subconuexa glabra, intus concaua venulis per longitudinem ductis parallelis percurfa. Gemmae laterales duae oppositae, vniualues: valuula membranacea, ouata, villosa; vel amentaceae vel foliiferae. Tubercula ad basin plerumque duo, fusca.

*GEMMA foliacea* priori minor, vniualuis: valuula membranacea ouata, vel oblonga acuminata apice, integra vel subbifida, lineis marginalibus duabus apice conniuentibus septa; glabra, fusco-nigricans vel fusca, externe subconuexa, interne concaua, dilutioris coloris, supra infraque etiam intra amenta posita. Gemmulae laterales duae minimae, subrotundae vniualues: valuulis fuscis villosis; foliiferae. *Foliatio* imbricata: foliolis (10—12) oblongis, glabris, ad neruos pilosis, intus viridibus.

*AMENTA mascula* (10—20) alterna, erecta, conica, dein cylindrica, teretia; vncialia primum, demum longiora fescuncialia; iuniora subuillofa, linearia; pedunculata: pedunculo semunciam longo, tereti, subtomentoso vel triphylo (a): foliolis ouato-lanceolatis, supra glabris saturate viridibus, subtus ad neruum saepe etiam margine pilosis, breuissime petiolatis; primum erectis, postea reflexis cum amentis deciduis; vel tetra-pentaphyllo (b): foliolis ouato-lanceolatis, glabris, subserratis alternis petiolatis, laete viridibus, persistentibus. Amenta a basi versus apicem



apicem sensim explicantur, exinde eorum forma conica. *Squamae* (c) primum laxius imbricatae, postea patentes, remotae; ovatae, obtusae, cochleariformes, e luteo virescentes, subuillosoe; anterie pilis raris, breuibz obsitae. *Stamina* tria (d); filamenta erecta, filiformia, distincta, aequali longitudine, intermedio saepe longiori; lateralibus spatium angulo Isosceles simile intercipiunt; squama duplo longiora, basi pilosa; antherae subrotundae, didymae, erectae, luteae, ante pollinis effusionem saepe aurantiacae. *Pollen* lutissimum. *Nectarium* anterie (e) subrotundum, apice obtusum rotundatum saepe levissime emarginatum, lutescens, basi squamulae sessile; *nectarium* posterius (f) in media squamulae cavitate sessile, tenue, gracile, subcapitatum, basi virescens.

*AMENTA feminea* (10 — 12) alterna erecta, linearia, viridescens, tenuissime villosa, vncialia, fescuncialia, pedunculata: pedunculo vnciali; foliolis (4 — 5) ovato-oblongis apice acutis sensim latiusculis, serratis, alternis, erectis vel patentibus, petiolatis, glabris, saturate viridibus; inferioribus binis ovato-lanceolatis minoribus, subtus ad nervum pilosis. *Stipulae* minimae, vel puncta fusca ad basin petioli. *Squamae* (g) ovato-lineares, apice obtusae e viridi albescens, subuillosoe, germine appressae. *Germen* (h) oblongum, compressum, glabrum, virescens, linea per medium sulcatum, pedicellatum; absque notabili intermedio stylo coronatus stigmatibus duobus minimis (i) diuaticis, patentibus, medio sulcatis luteo virore saturatis. *Nectarium* anterie basi pedicelli sessile, obtusum, truncatum (k) e luteo viridescens. *Nectarium* posterius minimum? *Capsula* (l) ovata, compressiuscula, luteo-viridis, linea media sulcata, eiusque ductu dehiscens; unilocularis bivalvis: valvulis reflexis (m). *Pappus* (n) brevis densus, rectus, pilis per lentem flexuosis, postea dense implexus. *Semina* (o) oblonga basi pappo cincta.

*FOLIA* (p) alterna ovato vel elliptico-lanceolata acuminata, inferiora ovata, maxima; crassiuscula, supra saturatius viridia, subtus pallidiora, nervo medio albido vel rufescente, prominulo; glabra splendens, reticulo venoso picta, margine serrata: serraturis cartilagineis, prominentibus; basi glandulis copiosis, saepe ramosis vel stipulis minutis occupata; petiolata: petiolo semunciali, canaliculato. *Stipulae* (q) amplae, trapezoideae, versus caulem rotundatae, subserratae, glandulis saepe in superiori parte tectae, colore et structura foliorum.

*VARIET. I.* Mas. Foliis serratis glabris angustioribus, amentis triandris tenuissimis. Frutex minoris altitudinis. Amenta tenuissima biuncialia, pedunculata:



lata: pedunculo foliis angustioribus lineari-lanceolatis acutissimis cincto. Stamina tria; filamenta tenuissima erecta; antherae flavae, minimae. Nec aliter nisi gracilitate a priori diversa.

2. *Salix auriculata* foliis ferratis glabris lanceolatis omnibus alternis. MILL. *Dict. 9.* (var. b. *Sal. triandr.* DU ROI *Obs. Botan.* p. 51.). *Salix* folio amygdalino utrinque aurito corticem abiciens. RAI. *Syn. 3.* p. 448. MILLERVS pro diversa specie habuit, quae quotannis corticem abiciens ramos fragiles et corticem luteum edit. Flores non descripsit. Cel. GMELIN pro varietate *S. triandr.* \*) habet, in eandem sententiam discedit Cel. DU ROI \*\*). Ex auctoritate itaque illorum virorum, non ex autopsia, adduxi.

Obs. Lignum album duriusculum. Rami saepius fragiles. Folia variabili magnitudine. Amenta odorata; variant floribus di- et triandris in eodem amento \*\*\*). Haec salix etiam virgas tenues praebet ad sportas, fiscinas, et crates, quibus ripae contra fluminum impulsus muniuntur, et similia conficienda. Cortex leniter adstringens et amaricans. Decoctum aquosum e luteo fuscum, amaricans, cum vitriolo martis nigrescit. Contra tertianam, quod in me expertus sum, eadem, ut *S. pentandra*, pollet virtute.

\*) *Fl. Sib.* l. c.

\*\*) *Obs. Bot.* l. c.

\*\*\*) *Hvds. Angl.* l. c.



H I S T O R I A  
S A L I C V M

ICONIBVS ILLVSTRATA

A

GEORGIO FRANCISCO HOFFMANN

---

FASCICVLVS TERTIVS.

---

Nectarium maximi fecit natura.

LINN.

---

LIPSIAE

IMPENSIS SIEGFRIED LEBRECHT CRVSII

MDCCCLXXXVI.

LIBRARY

M. V. C. I. J. A. 2. C.

1875-1876

1875-1876

1875-1876

1875-1876

1875-1876

1875-1876



---

# EXPLICATIO TABULARVM

## TERTII FASCICVLI.

---

### TAB. XI. XII.

#### SALIX VITELLINA.

- Fig. 1. *Mas.* Amenta in hoc paene omnia explicata ramulo, duobus tantum exceptis, in quorum vnico pedunculo adhuc gemmae valuula adstat. a.
- b. *Valuula* gemmae foliaceae, quae fere eodem tempore cum amentaceis explicantur.
- c. *Squama* cum duobus flaminibus et duplici nectario vario situ depicta, quo melius nectaria conspiciantur.
- d. *Staminum* filamenta, quae nunc
- e. recte protensa, vel
- f. deflexa et diuarcata basi tamen sua connata, et
- f\* saepius pilosa.
- g. *Antherae* erecto situ filamentis accommodata.
- h. *Nectarii* anterior pars crassior, vel, si mauis, nectarium anterius saepe
- h\* fissum.
- i. *Nectarium* posterius intra squamulam latens, cum anteriori vero coniunctum et foueolam pro filamentorum collocatione efficiens.

Fig. 2.

Fig. 2. *Femina* cum amentis florentibus.

- k. *Squama* cum germine et nectario et etiam germine exempto, vt melius in conspectum prodeat.
- l. *Germen*.
- m. *Stylus*.
- n. *Stigmata*.
- o. *Nectarium* germinis breuissimo pedunculo adnatum.
- p. *Capsula* integra, dehiscens
- q. *valuulis* primum hiantibus, dein
- r. reflexis.
- s. *Pappus* basi
- t. *femina* sessilis

Fig. 3. Ramulus cum amentis ad maturitatem peruentis et capsulis quibusdam hiulcatis, feminaque demittentibus.



## TAB. XIII. XIV.

## S A L I X F I S S A.

Fig. 1. *Mas.* In hoc ramulo amenta pleraque explicata, flaminibus in maioribus iam fissis.

- a. *Valvula* gemmae amentaceae.
- b. *Valvula* gemmae foliaceae.
- c. *Squama* cum flaminibus duobus magis minusve disiunctis et nectario.
- d. *Filamenta* ita coniuncta, ut pro vno habeas, naturali magnitudine.
- e. *Filamenta* superius tantum diuisa, demum ulterius diuergentia,
- f. basi tamen connata.
- g. *Antherae* altero latere, quo prius cohaerebant
- h. planae.
- i. *Nectarium* ad squamae basin sessile, filamentisque adnatum.

Fig. 2. Ramulus foliosus ex masculino frutice.

Fig. 3. *Femina* cum amentis florentibus et foliis superius iam euolutis

- k. *Squama* cum germine et nectario.
- l. *Germen*.
- m. *Stylus*.
- n. *Stigmata* primum erecta, dein
- n\* patentia.

O

o. Necta-

- o. *Nectarium* basi germinis sessile.
- p. *Capsula* dehiscens
- q. *valvulis* reflexis.
- r. *Pappus*.
- s. *Semen*.
- t. *Pappus* inuersus, vt circulus, in quem colligitur, conspiciatur.

Fig. 4. Ramulus femineus cum capsulis maturis et foliis.



## TAB. XV. XVI.

## S A L I X D E P R E S S A.

Fig. 1. *Mas.* Fruticuli pars e radice abscissa cum ramulis nouellis florentibus.

- a. *Gemmae* valuula amentacea.
- b. *Gemmae* valuula foliaceae.
- c. *Squama* a latere et anterieus depicta, cum duobus flaminibus et neclario.
- d. *Staminum* filamenta,
- e. cum neclario e squamula exenta.
- f. *Antherae*.
- g. *Neclarium* cum filamentis cohaerens.

Fig. 2. Ramulus foliosus ex fruticulo masculo.

Fig. 3. *Femina.* Fruticuli feminei pars, quae amenta gerit explicata.

- h. *Squama* cum germine et neclario.
- i. *Germen*.
- k. *Stigmata*.
- l. *Neclarium* basi pedunculi sessile.

m. *Capsula*

m. *Capsula* dehiscens

n. *valvulis* reflexis.

o. *Pappus*.

p. *Semina*.

Fig. 4. *Femina* cum amentis maturis et capsulis diffilientibus, pappumque euomentibus.



## SALIX VITELLINA.

Tab. XI. XII. Fig. 1. 2. 3.

*Salix vitellina*; foliis ferratis, ovato-lanceolatis, acutis, supra glabris: ferraturis cartilagineis.

*Salix vitellina*; foliis ferratis, ovatis, acutis, glabris: ferraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis. LINN. *Syst. Veget. Ed. 14. p. 879. n. 6. Syst. Pl. 4. p. 224. n. 5. Hort. Ups. 295. MILL. Dict. n. 4. WEIG. Fl. Pom. n. 619. NECK. Gallob. p. 394. DU ROI Obs. p. 52. n. 2. EIVSD. Harbk. 2. p. 393. LEERS Herb. n. 747. DOERR. Nass. p. 270. MATTVSCHK. Sil. n. 709. EIVSD. Enum. n. 926. RETZ. Prodr. Fl. Scand. n. 1083. HVDS. Fl. Angl. Ed. 2. p. 426. ALLIONII Fl. Pedemont. n. 1960.*

*Salix lento vimine et squama florali flauis, foliis elliptico-lanceolatis, subtus sericeis.* HALL. *Enum. p. 152.*

*Salix arborea, foliis ellipticis, lanceolatis, subtus sericeis, dentibus crassescens.* HALL. *Hist. n. 1635. Var. β.*

*Salix foliis lineari-lanceolatis, acuminatis.* GÜETT. *Stamp. 1. p. 206?*

*Salix lutea, tenuior, fatiua, viminea.* I. BAVH. *Hist. 1. p. 214. RAI. Hist. 1421. n. 7.*

*Salix fatiua lutea, folio crenato.* C. BAVH. *Pin. 473. DILL. Giff. p. 42. RVPP. Icn. Ed. 2. p. 331.*

Salicis alterum genus. FUCHS *p.* 335.

Salix vitellina. CORD. *in Diosc. l. c.* 137.

Salix tenuifolia dentata. MÜNTING. *l. c.* 12.

Gelbe Weide. Gelbe Bind- oder Bandweide. Gelbe Kieferweide. Dotterweide.

Goldweide. Gelbe Haarweide. Perlweide. Gelbe, rothe, braune Bandweide.

GLEDITSCH *Forstw. 2. p. 4. n. 42.* HOECK. *Gesch. p. 16.*

Die gelbe Weide, gelbe Bindweide, Goldweide. SVCKOW *Oec. Botan. p. 60.*

*n. 4. p. 360. n. 1.*

Die gelbe Weide. LINN. *Pfl. Syst. 2. p. 405.*

The Ofier, longleav'd yellow, goldstring Willow. *Angl.*

Ofier jaune. DU HAMEL *p. 248.*

Saule Ofier. DE LAMARCK *Fl. Franc. 2. p. 590.*

Amarinier, Bois jaune. *Gall.*

*Habitat* in Europa temperatiore, ad vias, ad ripas fluuiorum et ad fossas.

*Floret* Maio. Capsulae maturescunt Iunio.

#### DESCRIPTION.

ARBOR mediocris; caudex adscendens, erectus, arboreus teres, supra ramosus: ramis copiosis erectis, in arbore saepius putata strictissimis; in femina ramuli florentes penduli, vel deflexi, superius leuissime tomentosi, in mare saepe breuiores diffusi; tenacissimi, epidermide vitellina, vel ex viridi, vel aurantio lutescente obducti.

GEMMA amentacea (a) vniualuis: valuula ouato-subulata, apice acuminata subbifida, leuissime tomentosa, lineis marginalibus binis ac prominentibus cincta; externe subconuexa, basin versus magis complanata; colore ex cinereo, vel fusco lutescente; interne excavata pallida, venulis aliquot obscurioribus, praesertim sub linearum marginalium cauitate, percurfa. Tuberculum vnum, alterumue in ea tuberositate, cui infidet gemmae valuula.

GEMMA foliacea (b) vniualuis: valuula priori minore ex ouato breuissime acuminata, apice integra, vel subbifida, lineis marginalibus obtusioribus circumscripta, subconuexa, plerumque glabra, excepto tenuissimo tomento, quod saepius apicem valuulae obducit; colore ramuli vel pallidiore; supra amenta rarius,



rius, subtus ea frequentius locata. *Foliatio* lineari-lanceolata, conuoluto-imbricata; foliolis constans (6—7) in mare lanceolatis acutis, externe sericeis, in femina ouatis margine et neruo medio tantum pilosis; superioribus citius explicatis.

*AMENTA mascula* (6—7) alterna, erecta primum, dein reflexa, flexuosa, subhirsuta, cylindrica, gracilia, apicem versus paulo angustiora, biuncialia, vel longiora pedunculata: pedunculo femunciali tereti, tomentoso, tri-tetraphyllo: foliolis ouato-oblongis reflexis, margine et medio neruo pilosis, apice fuscis et inflexis, breuissime petiolatis, magnitudine diuersis. Alia nempe foliola inprimis superiora lanceolata, alia breuiora et apicem versus latiora, sed semper minora, quam in femineis amentis, etiamsi *S. alba* masculis amentis maiora. Folium paruum, vel squama fusca ouata, in angulo, quem pedunculus et ramus intercipiunt, non raro affident. Amenta ex media parte basin versus, postea apice efflorescunt. *Squamae* (c) imbricatae, laxe dispositae, ouato-lanceolatae, leniter concauae, apice acuminatae, sensimque basi angustatae, pilis simplicibus breuissimis adspersae. *Stamina* duo (d); filamenta erecta, vel reflexa (e f), filiformia, luteo-alba, squamam longitudine superant; basi connata, paucis et breuissimis pilis saepius obsita (f\*); antherae subrotundae, paruae, didymae, erectae, luteae (g). *Pollen* sulphureo colore. *Nectaria* duo, quorum anterius (h) paruum subouatum, truncatum, rotundatum, bifidum non raro ad basin usque (h\*), colore lutissimo; posterius (i) vero cum anteriori connatum, foveolam constituunt, pro filamentorum receptione; concolor cum anteriori, lineare et longius illo, intra filamenta et squamulae concauitatem locatum.

*AMENTA feminea* (6—8) alterna, primum erecta, dein vero ad omnem directionem flexa, cylindrica, teretiufcula, bi-triuncialia, pedunculata: pedunculo subtomentoso, vnciali, fescunciali, tereti, foliolis (4—5) instructo; superioribus binis oppositis, vel alternis maioribus patentibus, ex ouato oblongis, integerimis, in obtusum subfuscum acumen desinentibus, margine et apice subpilosis, inflexis, superne subconuexis, glabris, splendentibus, inferne pallidioribus; inferioribus foliolis minoribus, frequenter ad neruum medium pilosis, caeterum similibus, persistentibus. Folium paruum lanceolatum, vel inter reliqua foliola, vel ad amentorum basin saepius collocatum. *Squamae* (k) imbricatae lineari-lanceo-



lanceolatae, apice acuminatae, pilis breuissimis obsitae, basi tomentosae, colore ex albido lutescente, demum subfuscae. *Germen* (l) ouato-oblongum, fere sessile, basi ventricosum, sensimque angustatum, pallide luteum, glabrum, squama vix longius; stylus brevis, bifidus (m); stigmata duo, obtusa, crassiuscula, incisa (n) lutea. *Nectarium* anterius (o) simplex, breue, truncatum, ex superiori latiori parte basin versus angustum, pedunculo germinis breuissimo insidens, colore lutissimo. *Capsula* (p) ouato-oblonga, acuminata, basi ventricosa, breuissime pedunculata, maturitate e viridi lutescens, vel subfusca, apice dehiscens, unilocularis, bivalvis: valvulis primum hiantibus (q), dein reclinatis, postremo reflexis (r). *Pappus* (s) brevis, rectus, basi seminum sessilis. *Semina* (t) linearilanceolata, minutissima, viridiuscula.

**FOLIA** alterna, erecta, ouato-vel elliptico-lanceolata, acuminata, margine subferrata; ferraturis glandulosis, subfuscis; superiora folia superne subpubescentia, margine et subtus albida, subsericea, media supra glabra nitida, subtus glauca, vel caesia; inferiora integerrima; nervus medius seu cardinalis in omnibus lutescit, per medium folium ductus; laterales copiosi, paralleli, sursum directi. Folia longitudine variant, plerumque tres uncias longa et unciam lata; in feminea arbore semper latiora; splendentia et virore saturato; in mascula magis pubescunt; petiolis tres, quatuorue lineas longis, compressis, canaliculatis, leuissime pubescentibus. Stipulae nullae. Glandulae rarissimae.

**OBS.** Liber lutescens. Cortex in adultiore arbore cinereus, rimosus, intus cinameo colore; in iunioribus vel ramis constanter vitellinus; sapore amaro, adstringente. Lignum album tenacissimum, flexile; ideoque ad ligamina rusticorum, ad corbes faciendos, ad vites vincendas, et ad varium usum oeconomicum ob flexibilitatem et tenacitatem seruit haec Salix. In arborem saepe proceram excrescit; locis prouenit fabulosis. In femina sibi relicta rami penduli sunt, quibus iam e longinquo ab aliis facile dignoscitur, saepius putata arbor ramos emittit strictissimos. Pappus tenuis, papyrus exinde confecit SCHAEFFERVS \*), rudem quidem et fragilem; etiam pappum Gossypii vices docuit explere praesertim S. pentandrae Cl. WESTBEK \*\*). Cortex inferuit etiam ad tingenda,

variis

\*) *Versuche ohne alle Lumpen etc. Papier zu machen. Regensb. 1765. 1772.*

\*\*) WESTBEK *Swenk. bonull. p. 9.*



variis coloribus, addito inprimis lixiuio et fermentatione paratis \*). Masculae arbores rarius et plerumque minores femineis occurrunt.

HALLERVS hanc Salicem varietatem *S. albae* esse putauit. In medicina vt recipiatur certe non indigna est. Extractum eius valde amarum, febrifuga vi eadem, vt plures Salices, praestans.

9.

## S A L I X F I S S A.

Tab. XIII. XIV. Fig. 1. 2. 3. 4.

*Salix fissa*; foliis integris, oblongo-lanceolatis, acuminatis glabris.

*Salix Eleagnos*; filamentis vnico, bifido; ramis antheriferis. SCOP. *Carn. Ed. 2.*  
n. 1210?

Die gespaltene Weide.

*Habitat* in Europa ad ripas sabulosas fluuiorum, ad scaturigines, in Salicetis.

*Floret* Aprili. Capsulae maturefcunt Maio.

## D E S C R I P T I O.

FRUTEX orgyalis, saepius arborefcens, arbore tunc tenui, orgyas duas tresue alta; cortice cinereo glabro obductus; rami diffusi, vndique sparsi, virgati glabri, tenaces; superiores longiores; cortice cinerascete viridi, vel luteo, etiam subfusco tecti, nitente, saepius punctis minutis griseis adsperso.

GEMMA amentacea (a) vniualuis: valuula ouata, acuta, tenuis, scariosa, apice integra, rarius incisa, lineis binis lateralibus obtusis, apice confluentibus circumscripta; externe subconuexa, glabra, subfusca, basi saepissime brunna, vel nigricans; interne castaneo colore venulis aliquot nigris parallelis picta. Ad basin valuulae tubercula saepe duo, vel tria perparua.

GEMMA foliacea (b) terminalis vniualuis: valuula priori non raro vltra dimidium minore, oblonga, obtusa, integra, vel apice incisa, colore pallide fusco, vel ramulo concolore, glabro, lineolis binis lateralibus saepe in formam coni circumscripta, intus colore paulo saturatiori, venulis obscurioribus percurfa; supra

et

\*) SIEFFERT. II. 294.



et infra amenta saepissime etiam inter ea posita. *Foliatio* lineari-oblonga, oblique saepe ramulo adpressa, foliola laxè imbricata (6 — 7), lineari-lanceolata, longitudine aequali, pallide viridula, externe tenui serico obducta.

*Amenta mascula* alterna, incerto numero, nunc sparsa (3 — 4), nunc alternantia (10 — 12), ouato-cylindrica, apice obtusa, primum erecta, dein magis horizontaliter patentia, recta, vel etiam varie flexa, vncialia, fescuncialia, brevissime pedunculata: pedunculo sat firmo, tomentoso, foliolis plerumque binis oppositis, vel tribus, quatuor, cruciatim sitis cincto, lineari-lanceolatis, patulis, vel erectis, pallide viridi colore, superne glabris, subtus et margine tenuiter sericeis, apice subacutis. Amenta, priusquam stamina ultra squamas egressa sint, rubent, dehinc lutei coloris sunt; subhirsuta, a superiori sensim progrediendo ad mediam et imam partem efflorescunt, saepe etiam, ut in *S. monandra*, ex media vnius lateris parte prius euoluuntur stamina. *Squamae* (c) imbricatae, ouatae, planae, leuiter excauatae, densis et rectis pilis obsitae, seminigræ, dein rubicundae, basi lutescentes. *Stamina* duo; filamenta primum inter se ita cohaerentia, ut vnum tantum filamentum, fere ut in *S. monandra*, constituere videantur (d); quod sensim finditur in duo filamenta (e) filiformia superius diuergentia, basi sua tamen connata (f), squama longiora; antherae (g) subrotundae, vel ouatae, compressae vno latere, quo prius inter se cohaerebant, planae (h), didymae, quadriloculares, primum croceae, dein lutescentes, emarcidae subfuscae, (in *S. monandra* nigrae). *Pollen* pallide sulphureum. *Nectarium* (i) vnum, anterius, viridescens, apicem versus lutescens, subcylindricum, obtusum, basi latius ventricosum, ad squamae basin sessile, filamentis adnatum.

*Amenta feminea* (6 — 12) alterna, vel sparsa pauciora, cylindræa, minora masculis, vncialia circiter, etiam breviora, apice obtusa, erecta, vel patentia, matura reflexa, subpilosa, breuiter pedunculata: pedunculo sat firmo, tomento sericeo obducto, foliolis (2. 3. 4.) instructo, lineari-lanceolatis patentibus, vel reflexis, supra glabris, subtus tantum ad neruum medium pilosis, maioribus plerumque, quam in masculis amentis, colore pallide vel ex luteo viridi. *Squamae* (k) imbricatae planae, ouatae, apice obtusae, rotundatae, nigrescentes ultra mediam partem, basi virescentes, pilis rectis strictis obsitae. *Germen* (l)

ouato-



ouato-oblongum, vel pyriforme, albido villo obductum, basi ventricosum subrotundum sessile, supra squamam paululum productum; stylus (m) brevis tenuis, lutescens; stigmata duo, primum erecta (n), dein patentia, stylo tum longiora, eoque latiora, linearia, linea per mediam partem transversim ducta exarata, sublutea. *Nectarium* vnum, anterius, lineare, gracile, planum, truncatum, basi germinis sessile (o), colore stigmatum, vel paulo viridior. *Capsula* (p) ouato-subulata, albido-cinerea, subcinerea, lateribus angulosis compressis; dehiscens per mediam commissuram, unilocularis, bivalvis (q): valvulis reflexis, apice revolutis. *Pappus* brevis, densus, pilis rectis, tenuissimis nitidis (r). *Semina* minutissima, virescentia, lineari-oblonga (s), basi pappo in circulum collecto (t) cincta.

**FOLIA** (*Fig. 2.*) alterna, oblongo-linearia, vel lineari-lanceolata, integra (si lenti subiiciantur saepius tenuissimis denticulis, vel potius glandulis notata) apice acuminata, basi sensim angustiora, fere ut in apice, superne glabra, obscure et cinereo-viridia, inferne pallidiora, pilis tenuissimis et vix, nisi per lentem, conspicuis adspersa, ut potius glabra dicenda sint, uncias duas, tresve longa, semunciam maiora lata; nervus medius rectus prominens per medium folium ductus, ex albido levissime rufescens, nervi laterales ita tenues, ut vix appareant; petiolus brevis, teres, glaber, saepe contortus. Stipulae et glandulae nullae.

**OBS.** Cum *S. monandra*, praesertim florendi tempore, aliquam similitudinem habet, sed stamina fissa et folia satis eam distinguunt. Femina ab aliis salicibus eodem tempore et promiscue cum hac florentibus sollicite distinguenda, quae nunc amentis maioribus et stigmatibus latioribus, vel alio modo diversis, gaudent, nunc foliis plus minusve subtus incanis et maioribus occurrunt, quae ad alias adhuc nondum determinatas species pertinent. Cortex amaricans adstringens, liber virescens, lignum flexile quidem, sed debile et nullius tenacitatis.

## 10.

## S A L I X D E P R E S S A.

*Tab. XV. XVI. Fig. 1—4.*

*Salix depressa*; foliis integerrimis, ovato-oblongis, supra glabris, subtus ferrugineis.

*Salix*



*Salix repens*; foliis integerrimis, lanceolatis, vtrisque nudiusculis, caule repente.

LINN. *Syst. Veget. Ed. 14. p. 880. n. 27?* *Syst. Pl. 4. p. 231. n. 25?* LIGHTF. *Fl. Scot. 606?* RETZ. *Prodr. Scand. n. 1099?*

*Salix repens*; foliis integerrimis, lanceolatis, vtrisque subpilosis, caule repente.

LINN. *Syst. Nat. p. 646?* *Sp. Pl. p. 1020. n. 23?* *Fl. Suec. Ed. 2. n. 896?* GVN. *Noru. n. 989?*

*Salix repens.* SCOP. *Carn. Ed. 2. n. 1213.*

*Salix repens*; foliis integerrimis lanceolatis, subtus villosis, nitidis. HUDS. *Fl.*

*Angl. Ed. 2. 428. var. β?*

*Salix alpina pumila rotundifolia repens*, inferne subcinerea. C. B. *Pin. 474?*

*Salicis pumilae latifolium* Genus I. et II. CLVS. *Hist. p. 85.*

Die Sumpfweide, niederliegende Weide.

*Habitat* in Europae sylvis, locis vliginosis depressis, inter vaccinium oxycoccos.

*Floret* Maio. Capsulae maturescunt Junio.

#### DESCRIPTION.

FRUTICVLVS depressus, radice crassa repente, rugosa, nodosa, nigricante; ramulis sparsis partim procumbentibus, partim erectis; biennibus et annosioribus nodosis, glabris, rufescentibus, vel e viridi sordide lutescentibus, digitali et palmari altitudine; nouellis ramulis fusco-cinereis, gemmis vndique obfessis, tenuissima pube obductis, praesertim florentibus; tenacibus.

GEMMA amentacea (a) vniualuis: valuula subrotunda, vel ouali, glabra, apice obtusa, incisa, saepe bifida, lineis marginalibus duabus cincta, obtusis et rectis; externe ventricosa, vel conuexa, colore nigricante, vel castaneo, interne concaua, colore pallide fusco, auenia, substantia tenuis coriacea; tubercula rarius adsunt, minima.

GEMMA foliacea (b) vniualuis: valuula minima subrotunda, obtusa, apice bifida, saepe in duas partes diuisa, externe conuexa, ex fusco nigricans, glabra, (per lentem tamen subhirsuta); lineolae laterales parum distinctae a valuula; supra amenta pauciores gemmae plerumque terminantes ramulum proueniunt, infra ea pleraeque positaе sunt. *Foliatio* ouata, foliolis constat (9—10) imbricatis,



bricatis, ouatis vtrisque glabris, margine, etiam aliis subtus sericeis, nitidis, superne saturate viridibus, apice saepe rubris.

*Amenta mascula* (2 — 3) sparsa, adproximata, vel alterna (10 — 12), erecta, ouato-oblonga, subvillosa, semunciam circiter longa, lineas aliquot lata, breui et tereti subpiloso pedunculo infident, foliolis parvis, vel potius squamis, ouatis erectis, vtrisque glabris et viridibus, margine vel etiam subtus tenuissime sericeis, breuissime petiolatis cincto. Amenta ex basi apicem versus efflorescunt. *Squamae* (c) imbricatae, obouatae, apice obtusae subrotundae, fuscae, subvillosae, basi angustatae, lineares fere et canaliculatae, breuissimis et tenuissimis pilis obsitae, colore pallide viridi, potius planae, quam concauae. *Stamina* (d) duo; filamenta erecta, ratione squamarum longissima stricta, filiformia, albida, basi glabra, cum nectario cohaerent (e); antherae (f) paruae subrotundae, erectae, luteae, apice saepius rubrae, didymae quadriloculares. *Pollen* flauum. *Nectarium* (g) simplex erectum, conicum, viride, anterius, basi staminum sessile.

*Amenta feminea* (6 — 10) alterna, etiam sparsa, erecta, ouato-oblonga, subvillosa, semunciam longa, etiam breuiora, pedunculata: pedunculo tereti, subvillosa, plerumque longiore, quam in masculis amentis, foliolis cincto (4 — 5) ouato-lanceolatis, vel oblongis, supra viridibus glabris, subtus et margine villosis nitidis, apice saepe rubris, fere sessilibus aut breuissime petiolatis. *Squamae* (h) imbricatae oblongae obtusae apice et subvillosae: pilis tenuissimis breuibus, rectis, basi et externa squamae parte rarioribus; colore pallide viridi, maxima parte fusco. *Germen* (i) ex ouato oblongum, vel lanceolatum, pedunculatum, subviride subvillosum albidum, squama longius, sensimque ex ventricosa parte in stylum breuissimum angustatum, ex viridi lutescentem; stigmata duo, erecta, minima, incisa saepius (k), lutescentia, in ficcitate subfusca. *Nectarium* minimum basi pedunculi sessile, subviride, oblongum, apice obtusum (l). *Capsula* (m) ex ouato subulata, acuminata, basi ventricosa, maturitate ex viridi pallide lutescens, subglabra, vel tenuissime villosa, per mediam commissuram dehiscens, unilocularis, bivalvis: valvulis reflexis (n). *Pappus* tenuis, mollis: pilis tenuissimis, albis nitidis; basi seminum sessilis (o). *Semina* (p) viridiuscula linearia, truncata.



FOLIA (Fig. 2.) erecta, alterna, margine integerrima, unciam longa, semunciam lata, inferiora praesertim ovato-lanceolata, superiora magis ovato-oblonga, vel exacte ovata, acuta, inferiora apice potius obtusa, superne glabra, saturate viridia, venosa: venulis elevatis, reticulatis; inferne sericea nitentia, in aliis, quae tenuiori serico obducta sunt, potius glauca apparent; nervus medius seu cardinalis, rectus prominens, fusco-pallidus, laterales tenerrimi, alterni; petiolus brevis, crassus, subsericeus. Stipulae et glandulae nullae.

Obs. Synonyma, quae Salici huic respondeant, difficiliora extricatu non minus certe, quam quae congeneribus et valde confimilibus, Salicibus nempe arenariae, incubaceae, fuscae etc. LINNAEVS Salicem suam repentem folia habere vtrinque nudiuscula, praeterea vero in *Flora Suecica* vtrinque subpilosa dixit; quod vtrumque nostrae obstat, cui folia superius sunt glabra, inferius autem sericea. A Salice fusca, si quis cum hac permiscere vellet, distat, quod in illa folia amentis superiora nigrescant, quae in hac aequalem etiam exsiccata conservant colorem, ut taceam de figura certe nitida *Jacquini*ana, quam LINNAEVS Salici suae fuscae adposuit, sed a nostra Salice ea longe discrepat. Ad nostram, Salicem serpillifoliam quoad habitum, Cl. SCOPOLI sic nominatam, pertinere dixissem, nisi folia vtrinque glabra, et locus HALLERI *Hist. n. 1646.* illi adpositus, (qui vero, ut mihi videtur, potius S. herbaceam LINN. indicat) hoc plane prohibuissent. HUDSONIUS sub nomine S. repentis varietates aliquas, quae diversae Linneanae species sunt, comprehendit. Hisce omnibus computatis, melius novum nomen, quod ei imposui, quam incertum et vagum duxi; minus etiam de aliorum denominatione curiosus, quae nisi vivis variorum auctorum specimenibus inter se comparatis, determinanda; quam de certis et accuratis figuris, et descriptionibus ex omni parte perfectis sollicitus.

---



HISTORIA  
SALICVM

ICONIBVS ILLUSTRATA

A

GEORGIO FRANCISCO HOFFMANN

---

FASCICVLVS QVARTVS.

---

Nectarium maximi fecit natura.

LINN.

---

LIPSIAE

IMPENSIS SIEGFRIED LEBRECHT CRVSII

CLDCCCLXXXVII.

ALBANY, N. Y.

1857

ALBANY, N. Y.

ALBANY, N. Y.

ALBANY, N. Y.

ALBANY, N. Y.

ALBANY, N. Y.

ALBANY, N. Y.

ALBANY, N. Y.

ALBANY, N. Y.

ALBANY, N. Y.



---

EXPLICATIO TABULARVM  
QVARTI FASCICVLI.

---

TAB. XVII.

SALIX MYRSINITES.

Fig. 1. *Mas*, cum amentis explicatis ramulus.

- a. Squama cum flaminibus et nectario a latere naturali et aucta mole depicta.
- b. Eadem a posteriori conuexa parte, naturali forma.
- c. Nectarium.

Fig. 2. *Mas*, ramulus, in quo folia quidem explicari sensim incipiunt, et amenta in eo sunt, ut flamina plane euoluantur.

TAB. XVIII.

SALIX MYRSINITES.

Fig. 1. *Femina*, cum amentis florentibus.

- a. Squama cum germine et nectario, naturali et aucta forma.
- b. Squama a posteriori conuexa parte spectata, naturali forma.

Fig. 2. *Femina*, cum maturefcentibus capsulis.

TAB. XIX.

SALIX MYRSINITES.

Femineus ramus cum maturis capsulis et explicatis foliis depictus.

- a. Capsula integra,
- b. dehiscens haec, valuulis reuolutis.
- c. Pappus cum femine.

T A B. XX.  
S A L I X   H E R B A C E A.

Fig. 1. Femina.

- a. Germen cum squama ab anteriori,
- b. a posteriori facie conspectum, naturali et augmentata figura.
- c. Germen nudum in quo pedicelli cum anteriori,
- d. nectario et
- e. posteriori connexio conspici potest.

\*\* Ramulus annuus.

Fig. 2. Feminea arbuscula ex Lapponia statura eminentiori.

Fig. 3. Mascula arbuscula.

- f. Squama cum Nectario et staminibus,
- g. ab anteriori facie spectata, duplici adparente nectario, aucta mole.
- h. Squama nuda.
- i. stamina cum adnatis nectariis, naturali forma.
- k. Nectaria duo, modice aucta.

\* Folium squamosum.

Fig. 4. Arbuscula feminea cum matura et fissa capsula.

- l. Capsula integra, naturali magnitudine.
- m. Semen pappo cinctum.

T A B. XXI.

S A L. C A P R E A E F O L I A D I V E R S A F O R M A A C M A G N I T V D I N E.

Fig. 1.

- a. Folium ovatum margine dentatum, forma admodum frequenti.
- b. Ex maximis folium, quod praesertim in iuniori frutice non raro occurrit, margine crenato-vndulato; auersa pagina depictum. Haec varietas *latifolia* (T A B E R N. 1038.) non immerito vocatur.
- c. Aliud folium ex superioribus ramulis, in cuius media et infima parte etiam alia, forma (a) occurrunt, orbiculatum et apice inflexum. *Latifoliae rotundae* (B A V H. pin. 474.) varietas haec videtur.
- d. Foliorum fasciculus, forma ovata vtrique acuta (*Hist. sal. p. 28. var. 1.*), inferiora folia non raro margine vndulata et crenata esse solent (*Fl. Lapp. 365. t. 8. f. f.*) Hanc varietatem malle *laurifoliam* vocare, quum ut plurimum forma constantiori et non ita mutabili, ut in prioribus foliis, quae promiscue saepe in



vno eodemque ramulo crescunt, esse soleat, salix foliis integris subtus villosis ovato-lanceolatis utrinque acutis. *Fl. Lapp.* 361. *Tab. 8. fig. n.* hanc etiam indicare videtur, saltem figura plane respondet.

Fig. 2. Folia *sal. viminalis*.

- a. Defecata portio rami foliosi *sal. viminalis*.
- b. varietas alia *angustifolia* (*Hist. sal. p. 25. var. 3.*), aetate et magnitudine, ut videtur, a priori diuersa (*Chlor. Lugd. p. 29. var. β. vimin.*)
- c. Varietas foliorum, quae breuiora et serico crassiore obducta esse solent, promiscue cum priori crescens.

## T A B. XXII.

### SAL. AVRITAE FOLIA DIVERSA.

Fig. 1. Ramulus *sal. auritae* foliis integris verticaliter ovatis. (*Hist. sal. p. 32.*) *Fl. Lapp.* 369. *Tab. 8. Fig. 9.*

- a. Folium in aliis ramulis magis rotundum apice, tomentosum, margine undulato-ferratum.
- b. Folium aliud oblongum, margine leuissime undulatum, ex annosiori ramulo, et auersa pagina depictum.
- c. Ex inferioribus ramulis folium adhaerentibus auriculis, auersa pagina depictum.
- d. fasciculus foliorum *sal. auritae*. (*Hist. sal. p. 30.*)

Fig. 2. *sal. acuminatae* ramus foliosus.

- e. Folium ex annuis ramulis nondum plane explicatis.
- f. Ex inferioribus, fruticis folium.
- g. Aliud obuerse oblongum folium et apice obtusum, sine stipulis et auersa pagina depicta. Hac figura praesertim inferiora folia occurrunt.

## TAB. XXIII.

## SAL. MONANDRAE FOLIA.

Fig. 1. Ramulus *monandrae* foliosus.

a. Folium vnum ex inferioribus ramuli obuerse ouatum et apice obtusum.

Fig. 2. *sal. triandrae* ramus foliosus.

b. varietas foliis angustioribus. (*Hist. sal.* p. 47. var. 1.)

c. varietas foliorum ferraturis magis prominentibus et inaequalibus.

d. Alia varietas folio obuerse ouato ferrato, petiolo longissimo.

## TAB. XXIV.

Fig. 1. Ramulus foliosus *salicis vitellinae* Feminae.

Fig. 2. Ramulus foliosus *sal. myrsinit.* cum stipulis.

Fig. 3. Ramulus foliosus *sal. alb. maris.*



SALIX MYRSINITES.

Tab. XVII—XIX. Fig. 1—5. Tab. XXIV. Fig. 2.

*Salix myrsinites*; foliis ferratis glabris, ouatis, subdiaphanis.

*Salix myrsinites*; foliis ferratis glabris ouatis, venosis. LINN. *Syst. veget.* Ed. 14.

p. 879. n. 14? *Syst. Pl.* 4. p. 227. n. 13. *Fl. Suec.* Ed. 2. n. 885. GUNN. *Norv.*

n. 595. GÖVÄN *Ill.* 76. RETZ. *Prodr. Scand.* n. 1088. LIGHTF. *Fl. Scot.* 599.

HVDS. *Fl. Angl.* Ed. 2. p. 427.

*Salix myrtillifolia* spica crassissima. HALL. *Enum.* p. 153.

*Salix foliis* ouato lanceolatis teneris ferratis, stipulis lanceolatis. HALL. *Hist.*

n. 1647.

*Salix foliis* subferratis glabris subdiaphanis subtus glaucis, caule suffruticoso.

GMEL. *Sib.* 1. p. 166?

*Salix latifolia* folio vtrunque glabro, superne splendente. SCHEVCHZ. *It.* 1. p. 17?

*Salix alpina* pumila myrsinites. PONT. *Comp.* 149.

*Salix foliis* ferratis glabris ouatis. *Fl. Lapp.* 353. Tab. 8. Fig. f. Tab. 7. Fig. 6?

*Salix foliis* ferratis glabris verticaliter ouatis. *Fl. Lapp.* 352? Tab. 8. fig. e (quae melius respondet.)

Die glänzende Weide. LINN. *Pflanz. Syst.* 4. p. 555.

Die myrtenblättrige Weide. SVCKOW *Anfangsgründe der Bot.* 2. p. 41. n. 13.

Whortle leav'd Willow, Mountain Willow. *Angl.*

Krina-vie. *Norv.* Sciedgaskjerre. *Lapp. östfinn.*

*Habitat* in alpihus Lapponiae, Helvetiae, Italiae, Germaniae.

*Floret* Iunio. Capsulae maturescunt eodem mense.

## DESCRPTIO.

FRUTEX aliquot pedes altus; caulis glaber cortice fusco vel nigricante obductus, rami diffusi, erecti; Maris longiores, Feminae breviores diuaticati; superius saepe tomento cinereo velati.

GEMMA *amentacea* vniualuis: valuula ouata vel oblonga in Mare, subrotunda magis in Femina, apice emarginata, raro incisa vel bifida, angulis seu lineis marginalibus binis, pone marginem superiorem conniuentibus, septa; externe conuexa, tomentosa vel subhirsuta basi, colore sordide et cinereo fusco, vel nigricante; si valuulae glabrae sint externe per lentem subtilissime striatae apparent; intus pallidiores, venulis aliquot perfusae. Tubercula ad basin nulla.

GEMMA *foliacea* vniualuis: valuula priori minore, ouata vel subrotunda, ventricosa basi, apice obtusa, emarginata, raro bifida, lineae marginales pone apicem confluunt; externe conuexa tomentosa vel subhirsuta basi, sordide cinereo vel nigricante colore; interne concava pallidior venosa; supra et infra amenta locata. *Foliatio* oblonga, linearis imbricata, foliolis (6—7) glabris, teneris pellucidis, nervo dorsali pilosis, ouatis constans.

AMENTA *mascula* (4—5) alterna conferta, subvillosa, oblonga vel exouato oblonga, uncialia, fescuncialia, frequenter secunda, erecta vel inflexa, pedunculata: pedunculo breui, aliquot circiter lineas longo, hirsuto, foliolis paruis squamosis (3—4) lanceolatis erectis, externe pilosis viridibus cincto. Amenta plerumque e basi efflorescunt. *Squamae* imbricatae ouato-lanceolatae vel oblongae, apice e fusco rubrae, basi albido-virescentes, sparsis et flexuosis longis pilis apice et externe hirsutae (ab). *Stamina* duo; filamenta erecta, filiformia, squama longiora, basi connata, glabra et nectario plerumque adnata. *Antherae* subrotundae, erectae didymae, colore luteo ante explicationem saepe fuluo apice. *Pollen* luteum. *Nectarium* (c) lineare compressum, truncatum viridescens.

AMENTA *feminea* (3—5) alterna erecta vel reflexa breviora masculis, fescuncialia dum florent, ouato-oblonga, tenuissime hirsuta, breui villoso pedunculo instructa, foliolis maioribus quam in mare ouato-oblongis vel lanceolatis, margine subtiliter ferratis posterius ad neruum pilosis cincto. Sensim fiunt maiora amenta, ut in omni femineo amento fieri solet, germinibus in capsulas productis, tumque etiam foliola paulo excresecunt. *Squamae* planae oblongae, ouato-lan-



lanceolatae, obtuse acuminatae, pilis longis flexuosis et raris obsitae; antea subfuscae in rubrum vergentes, postea flauo-virescentes (b). *Germen* (a) ouato-lanceolatum, glaberrimum, breuiter pedicellatum et in breuem stylum attenuatum, coloris obscure viridis; stigmata duo crassiuscula, sulcata, apice inaequaliter incisa, colore flauescens. Nectarium simplex, basi pedicelli sessile, truncatum, planiusculum flauescens. *Capsula* (Tab. 19. a b c) ouato-lanceolata, basi ventricosa, pedicellata, glaberrima, maturitate e viridi flauicans, apice dehiscens unilocularis bivalvis: valvulis primum reflexis, demum reuolutis. *Pappus* splendens densus. *Semina* lanceolata pappo cincta.

Folia in ramulis, quae amenta proferunt, et eodem tempore, quo haec vigent, conferta alterna, exacte ouata vel obuerse ouata, utrinque glabra, tenuissima pellucida fere, apice obtuse prominula, patentia, subtus venosa, petiolo firmo breuiori tomentoso instructa, infima oblonga et minora; per marginem, ut et apicem versus crenaturis acutis plurimis notata (Vacc. myrtill. simillima); stipulis tum temporis nondum apparentibus, vel minimis earum loco punctis et laciniis tantum; sensim magis explicantur folia et distant, praesertim in femineo frutice eo tempore, quo maturescunt capsulae; demum in foliosis ramulis maxima adparent, pollicem transuersum lata et ulterius longa verticaliter ouata vel oblonga, cum breui acumine, utrinque fere concolora, inferius tamen distinctius venosa; margine vndique ferrata: ferraturis sinuatis; petiolo longiori, femunciali saepius instructa et stipulis trapeziformibus subrotundis ferratis.

Obs. Dubius nomen linnaeanum, eiusque synonyma adduco. Si Fig. 6. Tab. 7. Fl. Lapon. hanc salicem exhibere debet, certe pictor inculpandus, qui amenta (eodem tempore, quo maturescunt capsulae, videntur depicta) iusto breviora, pedunculum autem nimis longum depinxit. Neque florum amenta caerulea cum caesis filamentis in descriptione illius l. c. neque foliorum rigiditas in meam salicem quadrant, omnium vero minime germen villis albis vestitum, quod mihi glaberrimum. Folia ad iustam et integram magnitudinem peruenta non male fig. e. Tab. 8. exprimit (huius icon ad sal. arbusculam refertur), at in descriptione amenta tantum 4. linearum longitudinem aequare a b. LINNAEO dicuntur. Descriptio b. HALLERI l. c. quam proxime huic respondet, et forsan ratione aetatis nonnullae differrunt sal. Fl. Lapp. n. 352. 356. et 360. Myrtilloidem mallem hanc vocare, quam Sal. myrtilloid. LINN., cui folia integerrima. De-

pieta exemplaria debeo liberalitati et beneuolentiae rev. FRANC. XAV. a  
WVLFEN.

## 12.

## SALIX HERBACEA.

Tab. XX. fig. 1—4.

*Salix herbacea*; foliis ferratis glabris orbiculatis. *Syst. Veg. Ed. 14. p. 879. n. 16.*  
*Syst. Pl. 4. p. 228. n. 15. Fl. Suec. 2. n. 887. ROY. Lugdb. 82. GUNN. Norv. p. 51.*  
*n. III. IACQ. Vind. 296. GOVAN. Ill. 77. PALL. Il. 3. p. 33. LIGHTF. Fl. Scot.*  
*600. RETZ. Prodr. n. 1090. HUDS. Fl. Angl. Ed. 2. p. 427. ALLTON. Pedemont.*  
*1967.*

*Salix foliis orbiculatis, ferratis glabris, iulis paucifloris. HALL. Hist. n. 1649.*  
*Emend. III. n. 98.*

*Salix saxatilis minima. BAVH. Pin. 474. Prodr. 159.*

*Salix alpina Betulae nanae folio glabro, repens. RVD B. lap. 100.*

*Salix alpina Alni rotundo folio repens. TOURNEF. 591. DELAMAREK. Fl. Franc.*  
*var. β. fol. retus. 229.*

*Salix alpina minima, lucida, repens, Alni rotundi folio. BOCC. Mus. di piant. 2. p. 29.*

*Salix alpina Alni rotundo folio, repens ibid. Tab. 1. Fig. ult. RAI. suppl. 12. Angl. 3.*  
*p. 448. SCHEVCHZ. It. 11. p. 140.*

*Pyrola mariana, subrotundo vltmi folio glabro. PLUK. phyt. 436. Fig. 7.*

*Herba facie Pyrolae. MARTINS Reise nach Spitzbergen, p. 47. Tab. 5. ad B.*

*LINN. Fl. Lapp. 355. Tab. 7. Fig. 3. 4. Tab. 8. Fig. b. Fl. Dan. Tab. 117.*

*Krautartige Weide. LINN. Pfl. Syst. 4. p. 557. SVCKOW Anfangsgründe der Bot.*  
*2. 41.*

*Herbaceous Willow, the least Willow. Anglis.*

*Habitat in alpibus Lapponiae, Helvetiae, Germaniae.*

*Floret Iulio, Augusto; Capsulae maturescunt eodem mense.*

## DESCRPTIO.

Minima ARBVS CVLA aliquot digitos alta, crassa fatis radice, caule pollicis  
transuersi altitudine, cortice fusco glabro obducto; fibrillas (3—5) superius ra-  
muli emittunt, pollicares erecti, conferti, alterni, irregulares nodosi, radican-  
tes, superius geniculati, cortice cinereo vel fusco tecti.

GEMMA



**GEMMA amentacea** uniuersalis: valuula parua ouata vel oualis, subfusca aut nigricans, glabra, vno latere vel apice dehiscens, lineae marginales nullae; extus subconuexa, apice leniter compressa, intus concolor. Flores et Folia includens.

**GEMMA foliacea** uniuersalis: valuula minima hinc inde sparsa, ramulo concolor, integerrima subconuexa, ouata vel oblonga glabra. *Foliatio* imbricata, foliolis (3—4) glabris, petiolis pilosis.

**AMENTA mascula** terminalia 2—3 in eodem fruticulo, erecta oblonga, aliquot lineas longa tenuissime villosa, pauciflora, pedunculata: pedunculo filiformi longitudine amenti, pubescente, vno vel altero foliolo maximo orbiculari, subrotundo, herbaceo, apice saepius emarginato margine subtiliter serrato, glabro erecto, persistenti cincto, petiolus foliorum, quae cum amentis sed citius explicantur sat longus, pubescens ac teres et superius canaliculatus. Foliolum paruum ouato-lanceolatum colore squamularum saepius obtegit amenta (\*). *Squamae* (6—8) laxius imbricatae, remotae, ouatae vel oblongae, obtusae et rotundatae apice, subconuexae et inuolutae, breuissime villosae margine, e luteo virescentes (f). *Stamina* plerumque duo; filamenta erecta, filiformia, longitudine aequali basi connata, squama longiora; antherae minimae rotundae didymae, flavae. *Nectarium anterius* (\*) sat magnum subulatum teretiuseculum, viridescens, basi filamentorum sessile; *posterius* cum priori connatum lineare compressum breuius paululum concolor, in squamulae cauitate sessile (g).

**AMENTA feminea** terminalia 2—3 in eodem fruticulo viridescencia, breviora masculis, pedunculata: pedunculo filiformi longitudine amenti, villoso; foliis (2—3) vt in masculis amentis subrotundis vel ouatis, magnis herbaceis margine circumferratis, basi saepius emarginatis venosis, persistentibus et petiolatis cincto: petiolo semitereti ac pubescente. *Squamae* (3—6) imbricatae, ouatae truncatae, e viridi albescentes, demum fuscae, apice breuissime villosae, subconuexae, germi adpressae (b). *Germen* oblongum, subcompressum glabrum, pallide virescens, breuissime pedicellatum (c); stylus breuissimus; stigmata duo, bifida reflexa flavescentia. *Nectarium anterius* basi germinis sessile subouatum, compressum truncatum e luteo virescens (d); *posterius* cum anteriori connatum paruum lineare (e), inter haec germinis pedunculus. *Capsula* ouato-oblonga glabra rufescens, subcompressa, unilocularis bivaluis: valuulis reflexis (l). *Pappus* splendens rectus. *Semina* linearia basi pappo cincta (m).



FOLIA vel cum amentis vel ex propriis gemmis explicata, orbiculata, subrotunda et ouata fasciculata, quatuor vel quinque in caule, margine tenuissime et vix manifeste et acute ferrata, maxima circiter pollicis diametro; pellucida, apice obtusa, vel emarginata rarius cordata; glabra venosa, neruo medio subtus prominente, lateralibus pone basin folii concurrentibus; petiolata: petiolo semitereti canaliculato pubescente, in quibusdam iunioribus caulescente longo ac pellucido. *Stipulae et glandulae nullae.*

OBS. Ramuli annui recti, compressi ac teneri apice folium vnum alterumue gerentes (\*\*). Haec salix omnium minima arbuscula, et fruticulus quasi subterraneus, qui apicibus ramulorum modo e terra emergit, frigoris veluti impatiens. B. a LINNÉ in *Fl. Lapp.* folia maris et feminae manifeste differre et priora orbiculata quidem et latiora, apice parum emarginata dixit, posteriora vero magis cordata esse nec emarginata. Haec salix vix herbacea dici potest, sed durus fruticulus. Partes fructificationis in humillima planta ex maximis. Capsulam vnam alteramue maturat. Pabulum praebet equis et pecoribus optimum ac gratissimum. Hanc salicem summa auiditate reliquis praeferre tradit GUNNERVS l. c. Depictum exemplar fig. 2. palmari fere caule et foliolis crassioribus, rigidioribus, et distinctius ferratis, nervis foliorum magis prominentibus, pedunculo et squama villosioribus, Lapponiae incolam debeo liberalitati *cel. EHRHART*; reliqua Fig. 1—4 in summis alpibus carinthiacis *fladnizensibus*, Winterthal et Eishut collecta benigne mecum communicavit summe reuerendus pater FRANC. XAV. a WULFEN.



H I S T O R I A  
S A L I C U M

ICONIBUS ILLUSTRATA

A

GEORGIO FRANCISCO HOFFMANN

M. D.

---

VOLUM. II. FASCICULUS I.

---

L I P S I A E

IMPENSIS SIEGFRIED LEBRECHT CRUSII.

c1515ccxci.

L. B.

Tabula in ferie trigesima sequenti fasciculo continetur.



## SALIX RETICULATA.

*Tab. XXV. Fig. 1—3. Tab. XXVI. Fig. 1—3. Tab. XXVII.*

*Salix reticulata*; foliis integerrimis glabris ovatis obtusis. *Syst. veget. Ed. 14.*  
*p. 879. n. 18. Syst. Pl. 4. p. 229. Fl. Suec. 2. n. 888. GUNN. Noru. p.*  
*51. n. 110. JACQ. Vind. 296. GOUAN. Ill. 77. LIGHTF. Fl. Scot. 601.*  
*RETZ. Prodr. n. 1091. HUDS. Fl. Angl. Ed. 2. p. 428. LAMARK Fl.*  
*Franc. 2. p. 223. ALLION. Pedemont. 1967.*

*Salix foliis rotundis integerrimis, subtus tomentosis, julis gracilibus longe pe-*  
*tiolatis. HALL. Hist. n. 1650.*

*Salix pumila folio rotundo. BAUH. hist. 1. p. 12. TOURNEF. 590. SCHEUCHZ.*  
*It. alp. 1. p. 43. IV. p. 340. RAJ. syn. 449. hist. 1423.*

*Salix foliis integris glabris ovatis subtus reticulatis. Fl. Lapp. 359. Tab. 7.*  
*Fig. 1—2. Tab. 8. Fig. 1. Fl. Dan. Tab. 212.*

Netzartige Weide. LINN. *Pfl. Syst.* 4. p. 558. Suckow *Anfangsgr. der Bot.* 2. 42.

Wrinkled Willow. *Anglis.*

Saule reticulé. *Gall.*

*Habitat* in alpinis Lappon. Heluet. Suec. Norveg. Gall. Ital. Angl. Dan. Germaniae, Tirol. Styr. Austr. etc.

*Floret* Maio, Iulio.

#### DESCRIPTIO.

Vix humo se attollit palmaris vel digitalis *arbuscula* prostrata. Caulis pollicis vel digiti altitudine, cortice ex rufo fusco, vel cinereo inaequali geniculato obductus, ramuli perpauci consimiles, magnam partem nudi; radix satis crassa obliqua nodosa, ex fusco nigricans, fibrillis longis praedita.

GEMMA *amentacea* uniuersalis: valuula magna ouata glabra, emarginata apice subconuexa rufescens ex fusco, plerumque tria folia cum amento includens, apice et latere demum fissi.

GEMMA *foliacea* uniuersalis: valuula priori minor rufescens exterius, interne glabra sine venis, colore ceterum ut et structura non dissimilis.

AMENTA *mascula* plerumque simplicia terminalia, oblonga, uncialia subuilloso, longe pedunculata: pedunculo gracili flexuoso, sensim superiora versus crassiori pubescente; folia in eodem ramulo cum pedunculo tria, rarius duo alternatim posita, subrotunda, orbiculata emarginata vel oblonga, petiolata: petiolo




tiolo rubello canaliculato; integerrima, saturate viridia crassa rugosa venosa, superne venis quasi excavatis, subtus exstantibus cum nervis rubellis reticulata, glauca; in junioribus ad nervos et marginem pilosa sericea. *Squamae* laxae imbricatae obovatae concavae obtusae et rotundatae apice, basi contractae, brevi hirsutiae obductae, incarnati vel dilutioris rufo-fusci coloris basin versus. *Stamina* plerumque duo, debilia, erecta, demum recurva, aequali longitudine, basi contigua pubescentia, squama longiora; antherae parvae rotundae didymae ex incarnato flavescentes. *Nectarium* duplex: anterius crassiusculum ex oblongo attenuatum, viridi-flavescent, basi filamentorum sessile; posterius lineare, gracilescens, concolor intra squamam sessile.

*AMENTA feminea* terminalia simplicia, rarius duo in eodem ramulo, aequali latitudine, teretia, masculis sensim longiora, pedunculata: pedunculo longissimo tereti, superiora versus sensim crassiori, purpurascens, pubescente; foliis 3-2, ut in masculis amentis cincto, ovatis, apice rotundatis vel in oblongum porrectis acumen, latefcentibus; integerrimis crassioribus, saturate viridibus rugoso-venosis, subtus ex caeruleo incanis reticulatis: reticulo prominente concolore, vel a petiolo purpurascens rubello, demum in viridem deficiente; petiolus purpurascens canaliculatus sensim latefcent. *Squamae* imbricatae remotae, subrotundae concauiusculae rufo-fuscae, vel demum fuscae, apice hirsutae, germi adpressae. *Germen* ex subrotundo ovatum, villosum albidum, sessile; stylus brevissimus; stigmata duo brevissima bifida, flavescentia, demum fusca. *Nectarium* basi germinis lineare planiusculum flavescent. *Capsula* ovato-oblonga albida deterfo villo ex cinereo fusca, dehiscens

vnilocularis biualvis: valuulis reflexis. *Pappus* densus brevis. *Semina* linearia pappo cincta.

FOLIA vel ex propria vel ex amentacea Gemma, magnitudine et forma diuersa, ouata, elliptica, in mare tamen minus oblonga, obtusa, vel in oblongum acumen porrecta, crassa, rigidula, integerrima, aetate glabra utrinque, superne ex atro virentia, hinc inde rubiginosa et maculata, rugoso-reticulata, albidis in quibusdam conspicuis venis, subtus plus minusue ex viridi incana, neruis et reticulo venoso prominente, rubello in viridem definente, per aetatem cum foliis demum rubiginoso; petiolus sat longus, femiteres canaliculatus purpurascens, intra angulos cum ramulo interceptos gemmas futuri anni, obovatas virescenti fuscas, continens.





## S A L I X F U S C A.

Tab. XXVIII. Tab. XXIX. Fig. 1—2.

*Salix fusca*; foliis integerrimis, ovato-lanceolatis, subsessilibus nitidis, subtus glabris.

*Salix fusca*; foliis integerrimis, ovato-lanceolatis, subsessilibus nitidis, subtus primum villosis; amentis oblongo-ovatis, atro-rubentibus, albo-villosis pedunculatis. W V L F. (I A C. collect. V. II. p. 200.)

*Habitat* in montosis subalpinis Carinthiae.

*Floret* Majo.

## DESCRIPTIO.

*FRUTICVLVS* palmaris diffusus, radice crassa repente fibrosa fusca. Caulles plures ramosi prostrati nodulosi, cortice obscure rubro, vel ex fusco cinereo inaequali obducti, per intervalla frequenter iterum radicati.

*GEMMA amentacea* uniuersalis: valuula parua ex ovato subrotunda, glabra, apice obtusa emarginata, lineis marginalibus obsoletis, externe ventricosa, colore fusco-rubente, interne concaua nitida pallidior, venulis percursa, substantia tenuis coriacea.

*GEMMA foliacea* uniuersalis: valuula minor, subrotunda oblonga emarginata, conuexa, fusco-nigricans, glabra nitida, lineolae laterales obsoletae, interne color pallidior umbrinus.

*AMENTA mascula* terminalia, sparsa, ovato-oblonga, semuncialia, atropurpureascentia, albis pilis villosa, longe pedunculata: pedunculo tereti villoso, foliolis oblongis 3-5, erectis, subtus et margine tenuissime sericeis, cincto. *Squamae* imbricatae ovato-lanceolatae planiusculae, leniter concauae, apice et dorso atropurpureae subvillosae, reliqua parte dilutiores, sensim virentes.

*Stamina* duo; filamenta erecta filiformia, squama duplo triploue longiora, aquose rubella diaphana, basi coniuncta glabra; antherae parvae subrotundae, erectae, primum rubrae, dein ex polline flavae, demum nigricantes. *Nectarium* erectum gracile, tubuloso-cylindraceum, apice parum latefcens obtusum, ex albo subpurpurascens.

AMENTA *feminea* pauciora, sparsa, erecta ex ouato oblonga, tenuissime hirsuta, pedunculata: pedunculo tereti pubescente, sensim elongato, foliolis 3-5, ouatis, sed maioribus quam in mare cincto, erectis, subtus et margine tenuissime sericeis. *Squamae* imbricatae ouatae planiusculae, tenuissime hirsutae et rubrae maxima parte virescentes. *Germen* ex ouata basi elongato-rostratum, sessile, totum atro-purpureum glabrum, hinc inde etiam quasi tenuissime hirsutum; stylus a germinis rostro, bifidus erectus; stigmata duo obtusiuscula bifida, dilutius rubra, demum nigra. *Nectarium* lineare gracile, germi adhaerens. *Capsula* elongato-rostrata, basi ventricosa, maturitate ex viridi pallide lutescens glabra, unilocularis bivalvis: valvulis reuolutis rufo-flauescentibus. *Pappus* densus sericeus brevis, basin feminum, oblonga et ratione parvae falicis spectabili magnitudine, cingens.

FOLIA conferta erecta aeterna, margine integerrima, vncialia ouato-lanceolata, basi et apice acutiuscula, vel apice rotundata obtusa latiora, vtrinque glabra nitidula, firma, saturate viridia, reticulato-venosa, luci obuersa reticulo transparente, neruo medio saepius dilutissime rubello, petiolus brevis glaber in neruum cardinalem subtus prominentem decurrens. Stipulae et glandulae nullae.

OBS. Depicta exemplaria debeo liberalitati et beneuolentiae s. rev. *Franc. Xav. a Wulfen*.





## SALIX DECIPIENS.

Tab. XXXI.

*Salix decipiens*; foliis ferratis glabris lanceolatis petiolatis: inferioribus minoribus obouatis reflexis.

*Habitat* in Europa ad ripas fluviorum.

*Floret* Maio; capsulae maturescunt Iunio.

## DESCRIPTIO.

ARBOR vel FRUTEX ramosus: ramis copiosis diffusis, sparsis fragilibus, praesertim ad geniculos, cortice nitente ex viridi vel luteo subcinereo tectis.

GEMMA amentacea uniuersalis: valuula ouata ventricosa apice subbifida, lineis marginalibus prominentibus et usque ad apicem decurrentibus, glabra nitidula, colore ex castaneo fusco, interne pallidior venulis aliquot longitudinalibus percurfa. Tubercula sparsa in ea tuberositate, cui infidet gemmae valuula.

GEMMA foliacea supra et infra amenta iisque etiam interposita, uniuersalis: valuula priori minor, ouata, apice frequentius integra, lineae marginales obtusiores, nitida glabra subconuexa ex castaneo fusca. *Foliatio* conuoluta-imbricata, foliolis constans 6 - 7 glabris margine subsericeis. *Squamae* gemmaeae 2 — 3, ouatae membranaceae, coloratae: fuscae vel pallido-flauescentes.

AMENTA mascula sparsa (2 - 5) alterna, erecta primum, dein horizontalia, flexuosa, subhirsuta, ouato-oblonga dein cylindrica apicem versus paulo angustiora, uncialia fescuncialia, pedunculata: pedunculo semunciali tereti, glabro vel tenuissime villoso, cincto foliolis 3 - 5: ouato-oblongis, supremo lanceolato, infimo obouato, plerisque reflexis, apice et ex fusco flauescenti, membranaceo piloso inflexo, omnibus saturate virentibus nitentibus, breuiter petiolatis. *Squamae* gemmaeae saepius foliolis vel amentis adhaerent. Amenta ex media parte primum efflorescere incipiunt. *Squamae* imbricatae ouatae, leniter concauae, pilis longis hirsutae, e lutescente virides. *Stamina* duo, rarius tria; filamenta erecta filiformia luteo-alba, basi connata, saepius tenuissime hirsutae; antherae subrotundae, didymae erectae luteae. *Nectaria* duo, quorum anterius ex ouato attenuatum breue, saepius bi-trifidum, basi tamen latescens,

tescens, subviride, posterius brevius gracile, in cavitate squamæ sessile, cum anteriori etiam cohaerens et concolor.

AMENTA *feminea* etiam sparsa, numerosiora tamen in ramulis quam mascula, alterna erecta, cylindrica, bi-triuncialia, subhirsuta, pedunculata: pedunculo semunciali, sensim longiori, subtomentoso tereti, foliolis 4-5, ovato-oblongis erectis, sensim latioribus instructo: supremum lanceolatum, infimum obouatum reflexum, apice subfuscum vel lutescens inflexum pilosum, reliquis pedunculatis persistentibus. *Squamæ* imbricatae ex ovato oblongae, pilis longishirsutae, e luteo virescentes, concaviusculae. *Germen* ex ovato attenuatum virescens, pedunculatum; stylus a germine vix distinctus, medio depressus; stigmata quatuor obtusa lutea. *Nectarium* simplex breue truncatum obtusum, pedunculo germinis insidens, basi virescens, apice lutescens. *Capsula* ex ovato oblonga acuminata, pedunculata, maturitate e viridi lutescens vel subfusca, unilocularis bivalvis: valvulis reclinatis, reflexis. *Pappus* longus sericeus, basi feminis lanceolati sessilis.

OBS. Nomine *Sal. fragilis* L. diuersae species occurrunt, quae in eo quidem omnes conueniunt, quod ramuli digito concussi ad genicula annotina diffiliant, sed efflorescentia, foliis aliisque notis longe iterum discrepant. Decipientem hanc dixi, quia facile, cum specie valde consimili (*Sal. bigemmis*) permixta, obseruatorem minus curiosum ac circumspectum decipiat. Foliorum huius ut et prioris diuersitas in descriptione illius melius patebit.





---

## EXPLICATIO TABVLARVM

---

### TAB. XXV.

#### SALIX RETICVLATA.

- Fig. 1. Mascula arbuscula, cum amento et foliis amentaceis tribus.
- Fig. 2. Mascula arbuscula, cum amento et foliis amentaceis duobus.
- a. Squama cum nectariis et staminibus ab anteriori et naturali situ conspecta et lente vitrea aucta; eadem
  - b. a posteriori conuexa parte; in
  - c. staminibus exemptis, nectario anteriori, ac posteriori nunc melius observandis.
  - d. Stamina annexo anteriori nectario, e juvenili squama.
- Fig. 3. Mascula arbuscula, in qua praesertim folia duo amentacea, singulari rotunditate et magnitudine.

### TAB. XXVI.

#### SALIX RETICVLATA.

- Fig. 1. Feminea arbuscula, cum foliis amentaceis adhuc sericeis et amentis e gemma erumpentibus, quae
- Fig. 2. penitus explicata conspiciuntur.
- Fig. 3. Arbuscula cum amento maturefcente.
- a. b. Squama cum germine a posteriori conuexa facie.
  - c. Germen ab anteriori cum nectario, naturali et aucta forma.

## TAB. XXVII.

## SALIX RETICVLATA.

Arbuscula foliis et capsulis penitus explicatis.

- a. Capsula integra.
- b. Capsula fissa.
- c. Pappus cum semine, naturali forma.

## TAB. XXVIII.

## SALIX FVSCA.

Arbuscula mascula.

- a. Squama cum nectario et staminibus naturali et
- b. aucta forma.

## TAB. XXIX.

## SALIX FVSCA.

Fig. 1. Arbuscula femina

- a. Squama cum germine et nectario,
- b. ab anteriori conspecta.
- c. aliud germen provectoris aetatis. Aucta magnitudine.

Fig. 2. Ramulus cum maturefcentibus amentis.

## TAB. XXXI.

## SALIX DECIPIENS.

Maris et feminae florentis ramus, inter eos, particula abscissa, amentis adhuc gemmae valuulis, ac squamis gemmaceis tectis. Squamae femineae cum germine aucta figura, et masculae cum staminibus, etiam naturali forma depictae.






Fig. 1.



Fig. 3.




Fig. 2.





Fig. 1.



Fig. 2.








Fig. 1.



Fig. 2.







Fig. 1.



Fig. 2.








Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 3.

Fig. 4.





Fig. 1.

Fig. 2.







Fig. 1.



















Fig. 3.

Fig. 4.







Fig. 1.







Fig. 2.

Fig. 3.







Fig. 1.



Fig. 2.








Fig. 3.



Fig. 4.







Fig. 1.

Fig. 2.







Fig. 3.

Fig. 4.







Fig. 1.



Fig. 2.



















Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.







Fig. 2.

Fig. 1.







Fig. 1.

Fig. 2.







Fig. 1.

Fig. 2.









Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 2.







Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.







Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.







Tab. XXVII.



Autor del.

I. Nussbiegel sc.











Fig. 1.

Fig. 2.

































